herpy

PFEILGIFTFRÖSCHE

Ameerega pepperi

Ameerega pepperi ist ein kleiner, schwarzer Pfeilgiftfrosch mit gelben Streifen und roten, orangen oder gelben Zeichnungen aus dem zentralen Peru. Er lebt an Bächen im Wald in 380-1.000 m Höhe und ist wegen der Rodung gefährdet. Über die Haltung ist nur wenig bekannt, daher beruht sie auf dem Lebensraum und nahen Verwandten.

Familie: Dendrobatidae Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**3 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**8-12 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Bodenbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald und Feuchtgebiet**
Hautgift in der Natur	**Schwach**
Hautgift in Menschenobhut	**Keins** Nachzuchten. Wildfänge können ihr Gift lange behalten
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**60 × 45 × 45 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**21-25 °C**
Temperatur, Nacht	**18-21 °C**
Luftfeuchtigkeit	**75-100 %**
Wasser	**Wasserschale** Tiefe 1-2 cm
UVB	**Optional** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Insekten und kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen werden zum Wasser getragen**
Eiablage	**Am Boden**
Eier pro Gelege	**22-44**
Larvenzeit	**35-60 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Fertigfutter**
Brutpflege	**Bewacht das Gelege und trägt die Kaulquappen**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
IUCN	**Gefährdet (VU)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Haltung von *Ameerega pepperi* ist nur wenig bekannt. Die Art lebt an Bächen in feuchtem Wald in 380-1.000 m Höhe.
TEMPERATUR	Die Temperatur ist für die Art nicht dokumentiert; 21-25 °C tagsüber und 18-21 °C nachts liegen zwischen den Werten für *Ameerega bassleri* und *Ameerega hahneli*.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Luftfeuchtigkeit muss 75-100 % betragen.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Eine flache Wasserschale mit 1-2 cm Wasser und einem Stein oder Ast als Zugang genügt. Verwende Regenwasser, Osmosewasser oder entchlortes Wasser und wechsle es alle 2-3 Tage.
LICHT UND UVB	Biete pflanzenfreundliches Licht 10-12 Stunden täglich, mit Schatten und Verstecken. UVB ist für die Art nicht als notwendig dokumentiert, aber eine schwache UVB-Quelle (Ferguson-Zone 1) kann verwendet werden.
FÜTTERUNG	*Ameerega pepperi* ist klein und nimmt kleine Futtertiere: Fruchtfliegen (meist *Drosophila melanogaster*, weniger *Drosophila hydei*), Springschwänze und kleine Asseln.
VERHALTEN UND UMGANG	Die Männchen sind territorial und rufen von Steinen. Die Art wird am besten als Paar in einem Terrarium mit vielen Verstecken gehalten.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Peru.