herpy

PFEILGIFTFRÖSCHE

Ameerega petersi

Ameerega petersi ist ein kleiner, tagaktiver Pfeilgiftfrosch von 24-30 mm aus dem Regenwald am Fuß der Anden im östlichen Peru und westlichen Brasilien. Der Rücken ist braun mit einem hellen, schrägen Seitenstreifen. Die Art wird selten gehalten, und über die Haltung ist nur wenig bekannt.

Familie: Dendrobatidae Englisch: Peru Poison Frog Früherer Name: *Epipedobates petersi; Dendrobates petersi* Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**2-3 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**10-15 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Bodenbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald**
Hautgift in der Natur	**Schwach**
Hautgift in Menschenobhut	**Keins** Nachzuchten. Wildfänge können ihr Gift lange behalten
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**25-28 °C**
Temperatur, Nacht	**21-25 °C**
Luftfeuchtigkeit	**70-100 %**
Wasser	**Wasserschale** Tiefe 1-2 cm
UVB	**Optional** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen werden zum Wasser getragen**
Eiablage	**Am Boden**
Eier pro Gelege	**4-16**
Schlupf	**10-22 Tage**
Larvenzeit	**70-90 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Algen/Pflanzen und Fertigfutter**
Brutpflege	**Bewacht das Gelege und trägt die Kaulquappen**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Haltung von *Ameerega petersi* ist nur wenig bekannt, aber die Art wird in kleiner Zahl gehalten, und die Grundwerte für das Terrarium sind bekannt.
TEMPERATUR	Die Tagestemperatur beträgt 25-28 °C, und nachts wird sie um 3-4 Grad auf 21-25 °C gesenkt. Die Schwankung im Jahresverlauf beträgt nur 1-2 Grad.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Luftfeuchtigkeit muss 70-100 % betragen: nahe 100 % morgens und abends, gern mit Nebel, und etwa 70-80 % mittags.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Eine flache Wasserschale mit 1-2 cm Wasser genügt. Die Schale muss so flach sein, dass ein Jungtier wieder herauskommt, und Steine oder Moos am Rand haben. Wechsle das Wasser oft und reinige die Schale mit warmem Wasser ohne Seife.
LICHT UND UVB	Gib LED-Licht mit pflanzengeeignetem Spektrum 10-12 Stunden am Tag. UVB ist für Pfeilgiftfrösche nicht notwendig; ein schwaches UVB-Licht (Ferguson-Zone 1) ist optional.
FÜTTERUNG	Die Nahrung besteht aus kleinen lebenden Gliedertieren aus der Laubschicht.
VERHALTEN UND UMGANG	Die Männchen der Gattung rufen und verteidigen kleine Territorien. Es ist nicht beschrieben, wie sich *Ameerega petersi* in Gruppen verhält, daher ist ein Paar die sicherste Haltungsform.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Peru und Brasilien.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/pilegiftfroeer/ameerega-petersi