herpy

PFEILGIFTFRÖSCHE

Ameerega picta

Ameerega picta ist ein kleiner, tagaktiver Pfeilgiftfrosch mit dunkelbraunem Rücken, schwarzen Seiten mit hellen Streifen und gelben bis roten Flecken an den Oberschenkeln. Er lebt am Waldboden vom Amazonas-Tiefland bis zum Fuß der Anden in Bolivien, Peru, Kolumbien und Brasilien und hat einen isolierten Bestand in Venezuela. Die Art wird nur selten gehalten, daher beruht die Haltung auf dem Klima im Verbreitungsgebiet und auf nahen Verwandten.

Familie: Dendrobatidae Englisch: Spot-legged Poison Frog Früherer Name: *Epipedobates pictus; Dendrobates pictus* Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**22-28 mm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**8-12 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Bodenbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald und Bergwald**
Hautgift in der Natur	**Schwach**
Hautgift in Menschenobhut	**Keins** Nachzuchten. Wildfänge können ihr Gift lange behalten
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen werden zum Wasser getragen**
Eiablage	**Am Boden**
Eier pro Gelege	**15-40**
Schlupf	**15-22 Tage**
Larvenzeit	**40-90 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Algen/Pflanzen und Fertigfutter**
Brutpflege	**Trägt die Kaulquappen**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**21-25 °C**
Temperatur, Nacht	**18-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**70-100 %**
Wasser	**Wasserschale** Tiefe 1-2 cm
UVB	**Optional** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Paarweise**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Haltung von *Ameerega picta* ist nur wenig bekannt. Die Art wird nur selten gehalten, und die große Höhenverbreitung macht es schwer zu sagen, an welches Klima der einzelne Bestand angepasst ist.
TEMPERATUR	Halte das Terrarium tagsüber bei 21-25 °C und lass die Temperatur nachts um 3-4 °C auf 18-22 °C fallen. Die Schwankung im Jahresverlauf soll klein sein, 1-2 °C.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Luftfeuchtigkeit muss mittags 70-80 % und morgens und abends nahe 100 % betragen.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Biete eine flache Wasserschale mit 1-2 cm Wasser, aus der die Frösche leicht wieder herauskommen, mit Steinen oder Moos am Rand. Die Schale wird von den erwachsenen Tieren genutzt, wenn die Kaulquappen abgesetzt werden sollen.
LICHT UND UVB	Das Licht dient in erster Linie den Pflanzen: 10-12 Stunden am Tag mit LED-Licht mit pflanzengeeignetem Spektrum. Es ist nicht dokumentiert, dass *Ameerega picta* UVB braucht.
FÜTTERUNG	Der Frosch lebt in der Natur von kleinen Gliedertieren.
VERHALTEN UND UMGANG	*Ameerega picta* ist tagaktiv und lebt meist am Boden. Die Männchen der Gattung verteidigen kleine Territorien, daher ist ein Paar die sicherste Haltungsform. Halte nicht zwei Männchen in einem kleinen Terrarium zusammen.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Bolivien, Brasilien, Peru, Kolumbien und Venezuela.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/pilegiftfroeer/ameerega-picta