herpy

PFEILGIFTFRÖSCHE

Epipedobates anthonyi

Epipedobates anthonyi ist ein kleiner, roter und gestreifter Pfeilgiftfrosch von 19-27 mm aus dem Südwesten Ecuadors und dem Nordwesten Perus. Es ist der Frosch, der jahrzehntelang als „tricolor“ verkauft wurde, und er ist wohl der am häufigsten gehaltene und nachgezüchtete Pfeilgiftfrosch überhaupt: robust, dreist, ruffreudig und ein eifriger Züchter.

Familie: Dendrobatidae Englisch: Anthony's Poison Arrow Frog Früherer Name: *Dendrobates anthonyi; Phyllobates anthonyi* Veröffentlicht am 15. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**19-27 mm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**5-14 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Bodenbewohnend**
Lebensraum	**Trockenwald**
Hautgift in der Natur	**Schwach**
Hautgift in Menschenobhut	**Keins** Nachzuchten. Wildfänge können ihr Gift lange behalten
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen werden zum Wasser getragen**
Eiablage	**Am Boden**
Geschlechtsreif	**5-10 Monate**
Eier pro Gelege	**10-40**
Schlupf	**9-14 Tage** bei 22-24 °C
Larvenzeit	**43-89 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Algen/Pflanzen und Fertigfutter**
Brutpflege	**Bewacht das Gelege und trägt die Kaulquappen**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H für 3 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**22-26 °C**
Temperatur, Nacht	**18-21 °C**
Luftfeuchtigkeit	**80-100 %**
Wasser	**Wasserschale** Tiefe 1-2 cm
UVB	**Optional** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Paarweise oder in Gruppen**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
IUCN	**Potenziell gefährdet (NT)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein Terrarium von mindestens 40 × 40 × 40 cm eignet sich für ein Männchen und zwei Weibchen von *Epipedobates anthonyi*.
TEMPERATUR	Halte tagsüber 22-26 °C mit sowohl kühleren als auch wärmeren Zonen und lass die Temperatur nachts auf Zimmertemperatur sinken, etwa 18-21 °C. Die Art verträgt 18-27 °C, am besten etwa 21-24 °C, und über 29 °C ist gefährlich.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Luftfeuchtigkeit sollte bei 80-100 % liegen. Die Art verträgt kurzzeitig bis zu 50 %, wenn sie Zugang zu Wasser hat, doch niedrige Luftfeuchtigkeit ohne Wasser kann schnell tödlich werden.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Lege ein oder mehrere kleine Wasserstellen mit etwa 2 cm Wasser an, z. B. Untersetzer, Trinkschalen oder halbe Paranussschalen, aus denen die Frösche leicht herauskommen.
LICHT UND UVB	Das Licht ist für die Pflanzen da. Leuchtstoffröhren oder LED-Leisten für etwa 12 Stunden am Tag genügen, und die Tageslänge kann gern im Jahresverlauf etwas variieren.
FÜTTERUNG	*Epipedobates anthonyi* ist klein, aber gefräßig und nimmt verhältnismäßig große Beutetiere.
VERHALTEN UND UMGANG	*Epipedobates anthonyi* ist tagaktiv, dreist und oft zu sehen, und die Männchen rufen mit einem Triller, am meisten morgens und nach dem Sprühen.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Ecuador und Peru.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/pilegiftfroeer/epipedobates-anthonyi