herpy

PFEILGIFTFRÖSCHE

# *Epipedobates espinosai*

*Epipedobates espinosai* ist ein kleiner, tagaktiver Pfeilgiftfrosch von 13-20 mm mit kupferbraunem bis dunkelrotem Rücken, bei manchen Beständen schwarz mit orangefarbenen Flecken. Er lebt in feuchtem Wald im Tiefland und am Fuß der Anden im Nordwesten Ecuadors. Die Art wird kaum gehalten, und über die Haltung ist nur wenig bekannt.

Familie: Dendrobatidae  Englisch: Espinosa Poison Frog  Früherer Name: *Dendrobates espinosai; Phyllobates espinosai; Epipedobates darwinwallacei*
Veröffentlicht am 16. November 2026

## STECKBRIEF

### DAS TIER

| | |
|---|---|
| Größe (adult) | **13-20 mm**<br>Kopf-Rumpf-Länge |
| Lebenserwartung | **8-10 Jahre** |
| Aktiv | **Tagsüber** |
| Lebensweise | **Bodenbewohnend** |
| Lebensraum | **Regenwald und Bergwald** |
| Hautgift in der Natur | **Schwach** |
| Hautgift in Menschenobhut | **Keins**<br>Nachzuchten. Wildfänge können ihr Gift lange behalten |
| Schwierigkeitsgrad | **Erfahren** |

### ZUCHT

| | |
|---|---|
| Fortpflanzung | **Eierlegend** |
| Entwicklung | **Kaulquappen werden zum Wasser getragen** |
| Eiablage | **Am Boden** |
| Eier pro Gelege | **10-30** |
| Schlupf | **9-14 Tage** |
| Larvenzeit | **42-70 Tage**<br>vom Schlupf bis zur Metamorphose |
| Larvenfutter | **Algen/Pflanzen und Fertigfutter** |
| Brutpflege | **Bewacht das Gelege und trägt die Kaulquappen** |

### HALTUNG

| | |
|---|---|
| Mindestgröße Terrarium | **40 × 40 × 40 cm**<br>L × B × H für 3 erwachsene Tiere |
| Temperatur, Tag | **22-26 °C** |
| Temperatur, Nacht | **19-22 °C** |
| Luftfeuchtigkeit | **80-100 %** |
| Wasser | **Wasserschale**<br>Tiefe 1-2 cm |
| UVB | **Optional**<br>Ferguson-Zone 1 |
| Ernährung | **Kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)** |
| Haltung | **Paarweise oder in Gruppen** |

### SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

| | |
|---|---|
| CITES | **Anhang II** |
| IUCN | **Ungenügende Datengrundlage (DD)** |

## Haltung auf einen Blick

| | |
|---|---|
| **DAS TERRARIUM** | Über die Haltung von *Epipedobates espinosai* ist nur wenig bekannt, und die Art wird kaum gehalten. |
| **TEMPERATUR** | Halte tagsüber 22-26 °C mit etwas kühleren und etwas wärmeren Stellen im Terrarium und nachts 19-22 °C. Tiere aus Mindo und anderen hochgelegenen Orten fühlen sich am kühlen Ende am wohlsten. |
| **LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN** | Die Luftfeuchtigkeit soll 80-100 % betragen. Besprühe mehrmals täglich oder verwende eine Regenanlage, z. B. dreimal täglich 20-60 Sekunden, gern ergänzt durch einen Vernebler. |
| **WASSER UND WASSERQUALITÄT** | Eine flache Wasserschale mit 1-2 cm Wasser, z. B. ein niedriger Untersetzer oder eine halbe Paranussschale, gibt den Fröschen einen Ort zum Trinken und Baden und ist Fortpflanzungsplatz, wenn das Männchen Kaulquappen absetzt. |
| **LICHT UND UVB** | Das Licht ist für die Pflanzen: Leuchtstoffröhren oder LED-Leisten etwa 12 Stunden am Tag. Die nahe verwandten Arten gedeihen ohne UVB, es ist also optional. |
| **FÜTTERUNG** | Die Frösche bekommen lebende, kleine Beutetiere: Springschwänze und Taufliegen (*Drosophila melanogaster*), und erwachsene Tiere nehmen zusätzlich die größere *Drosophila hydei* und frisch geschlüpfte Heimchen. |
| **VERHALTEN UND UMGANG** | *E. espinosai* ist tagaktiv und bewegt sich offen zwischen Gras und Laub. Die Männchen der Gattung sind territorial und rufen von festen Plätzen; die braunen und die orangegefleckten Bestände haben fast gleiche Rufe. |
| **NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET** | Ecuador. |