herpy

PFEILGIFTFRÖSCHE

Oophaga arborea

Oophaga arborea ist ein kleiner Pfeilgiftfrosch von 20-22 mm, der hoch oben in den Bäumen des feuchten Bergwalds im Westen Panamas lebt. Er ist schwarz oder braun mit runden gelben Flecken, pflanzt sich in Bromelien 10-16 m über dem Boden fort, und die Kaulquappen ernähren sich nur von Eiern des Weibchens. Die Art ist vom Aussterben bedroht.

Familie: Dendrobatidae Englisch: Polkadot Poison Frog Früherer Name: *Dendrobates arboreus* Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**20-22 mm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**5-10 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend**
Lebensraum	**Bergwald**
Hautgift in der Natur	**Schwach**
Hautgift in Menschenobhut	**Keins** Nachzuchten. Wildfänge können ihr Gift lange behalten
Schwierigkeitsgrad	**Experte**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen werden zum Wasser getragen**
Eiablage	**In Blattachseln (z. B. Bromelien)**
Eier pro Gelege	**4-8**
Schlupf	**14 Tage**
Larvenzeit	**40-50 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Unbefruchtete Eier des Weibchens**
Brutpflege	**Bewacht das Gelege, trägt die Kaulquappen und füttert die Kaulquappen mit Eiern**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**60 × 45 × 80 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**20-24 °C**
Temperatur, Nacht	**15-19 °C**
Luftfeuchtigkeit	**70-100 %**
Wasser	**Keine Wasserschale**
UVB	**Optional** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Paarweise**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
IUCN	**Vom Aussterben bedroht (CR)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Haltung von *Oophaga arborea* gibt es fast kein Wissen, und die Art ist in menschlicher Obhut nahezu unbekannt.
TEMPERATUR	Die Tagestemperatur sollte bei 20-24 °C liegen, und nachts muss sie um mindestens 4-5 °C fallen, auf etwa 15-19 °C. Das entspricht dem Klima des Nebelwalds mit einer Jahresmitteltemperatur von etwa 19 °C.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Luftfeuchtigkeit sollte tagsüber bei 70-80 % liegen und nachts auf 100 % steigen.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Eine Wasserschale ist nicht nötig. Die Frösche bekommen Feuchtigkeit aus Nebel, Regen und den wassergefüllten Bromelien, die auch für die Kaulquappen genutzt werden.
LICHT UND UVB	Die Art lebt hoch oben in den Kronen, wo das Licht stärker ist als am Waldboden, doch der Nebel dämpft es.
FÜTTERUNG	Erwachsene Tiere bekommen kleine, flugunfähige Bananenfliegen, Springschwänze, frisch geschlüpfte Mikrogrillen und Wiesenplankton; dieselben Futtertiere werden für die übrigen Arten der Gattung verwendet.
VERHALTEN UND UMGANG	*Oophaga arborea* ist ein tagaktiver Baumfrosch, der selten am Boden zu sehen ist.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Panama.