herpy

PFEILGIFTFRÖSCHE

Oophaga vicentei

Oophaga vicentei ist ein kleiner, farbenprächtiger und tagaktiver Pfeilgiftfrosch von bis zu 24 mm, der nur in Zentralpanama vorkommt. Die Farben reichen von Gelb und Rot bis Blau, Grau und Grün, oft mit einem schwarzen Netzmuster. Die Art ist in der Natur bedroht, und über die Haltung gibt es nur wenig Wissen.

Familie: Dendrobatidae Englisch: Vicente's Poison Frog Früherer Name: *Dendrobates vicentei* Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**12-24 mm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**10-15 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend und bodenbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald**
Hautgift in der Natur	**Schwach**
Hautgift in Menschenobhut	**Keins** Nachzuchten. Wildfänge können ihr Gift lange behalten
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen werden zum Wasser getragen**
Eiablage	**In Blattachseln (z. B. Bromelien)**
Eier pro Gelege	**1-12**
Schlupf	**10-14 Tage**
Larvenzeit	**42-56 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Unbefruchtete Eier des Weibchens**
Brutpflege	**Bewacht das Gelege, trägt die Kaulquappen und füttert die Kaulquappen mit Eiern**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**22-26 °C**
Temperatur, Nacht	**19-21 °C**
Luftfeuchtigkeit	**80-100 %**
Wasser	**Wasserschale** Tiefe 1-2 cm
UVB	**Optional** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Paarweise**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
IUCN	**Stark gefährdet (EN)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Haltung von *Oophaga vicentei* gibt es nur wenig Wissen.
TEMPERATUR	Die Tagestemperatur sollte 22-26 °C betragen und die Nacht 19-21 °C. Die Frösche vertragen Wärme schlecht, daher sind längere Phasen über 28 °C zu vermeiden.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Luftfeuchtigkeit sollte 80-100 % betragen und nie unter 70 % fallen.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Eine flache Wasserschale mit 1-2 cm Wasser genügt, denn die Frösche sind schlechte Schwimmer. Halte sie sauber und wechsle das Wasser jeden oder jeden zweiten Tag.
LICHT UND UVB	UVB ist kaum nötig, doch etwas UVB (Ferguson-Zone 1) schadet nicht und ist optional. Pflanzenlicht 10-12 Stunden am Tag hält die Pflanzen am Leben, und die Nacht muss dunkel sein.
FÜTTERUNG	Die Art braucht sehr kleine Futtertiere. Das Grundfutter sind kleine, flugunfähige Bananenfliegen (*Drosophila melanogaster*) und Springschwänze, ergänzt durch Blattläuse, kleine Termiten und kleine Asseln.
VERHALTEN UND UMGANG	*Oophaga vicentei* ist tagaktiv. Das Männchen ruft von einem Platz hoch oben und findet den Fortpflanzungsort. Weibchen können die Eier anderer Weibchen fressen, daher ist ein Paar am sichersten.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Panama.