herpy

PFEILGIFTFRÖSCHE

Phyllobates aurotaenia

Phyllobates aurotaenia ist ein tagaktiver Pfeilgiftfrosch von 3-4 cm von der Pazifikküste Kolumbiens, schwarz mit zwei grünen bis goldenen Streifen entlang des Rückens. Wilde Tiere tragen ein tödliches Hautgift, doch Nachzuchttiere sind ungiftig. Die Art ist dreist, ruft laut und lässt sich leicht zur Zucht bringen.

Familie: Dendrobatidae Englisch: Kokoe Poison Frog Früherer Name: *Dendrobates aurotaenia* Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**3-4 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**10-20 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Bodenbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald**
Hautgift in der Natur	**Stark**
Hautgift in Menschenobhut	**Keins** Nachzuchten. Wildfänge können ihr Gift lange behalten
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**60 × 45 × 45 cm** L × B × H für 4 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**21-24 °C**
Temperatur, Nacht	**18-21 °C**
Luftfeuchtigkeit	**70-100 %**
Wasser	**Wasserschale** Tiefe 1-2 cm
UVB	**Optional** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Paarweise oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen werden zum Wasser getragen**
Eiablage	**Am Boden**
Geschlechtsreif	**8-10 Monate**
Eier pro Gelege	**8-28**
Larvenzeit	**60-80 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Fertigfutter**
Brutpflege	**Trägt die Kaulquappen**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein Paar oder eine kleine Gruppe *Phyllobates aurotaenia* braucht ein Regenwaldterrarium von mindestens 60 × 45 × 45 cm für bis zu 4 erwachsene Tiere.
TEMPERATUR	*Phyllobates aurotaenia* gedeiht am besten kühl. Die Tagestemperatur sollte bei 21-24 °C liegen, und nachts wird sie auf 18-21 °C abgesenkt.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Luftfeuchtigkeit sollte bei 70-100 % liegen. Die Art verträgt kurzzeitig bis hinunter zu 50 %, wenn sie Zugang zu Wasser hat, doch niedrige Feuchtigkeit ohne Wasser kann schnell tödlich werden.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Eine flache Wasserschale mit 1-2 cm Wasser und einem Stein oder einem schrägen Rand, damit die Frösche leicht hinaufkommen, genügt.
LICHT UND UVB	Das Licht ist in erster Linie für die Pflanzen. Leuchtstoffröhren oder LED-Licht mit etwa 6.500 K geben natürliche Farben und gutes Pflanzenwachstum, und etwa 12 Stunden Licht am Tag sind üblich.
FÜTTERUNG	*Phyllobates aurotaenia* frisst kleine Gliederfüßer. Jungtiere nehmen flügellose *Drosophila melanogaster*, während Erwachsene gern größere Futtertiere wie *Drosophila hydei* und ganz kleine Heimchen fressen.
VERHALTEN UND UMGANG	*Phyllobates aurotaenia* ist tagaktiv und dreist, als Jungtier aber scheu.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Kolumbien.