herpy

PFEILGIFTFRÖSCHE

Ranitomeya imitator

Ranitomeya imitator ist ein kleiner, tagaktiver Pfeilgiftfrosch von 16-20 mm aus dem Norden Perus. Jede lokale Form ahmt einen anderen Giftfrosch im selben Gebiet nach, und die Art war der erste Lurch, bei dem echte Monogamie nachgewiesen wurde: Das Paar betreut den Nachwuchs gemeinsam, und das Weibchen füttert jede Kaulquappe mit unbefruchteten Eiern.

Familie: Dendrobatidae Englisch: Mimic Poison Frog Früherer Name: *Dendrobates imitator; Ranitomeya intermedia* Veröffentlicht am 15. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**16-20 mm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**5-10 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend und bodenbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald und Bergwald**
Hautgift in der Natur	**Schwach**
Hautgift in Menschenobhut	**Keins** Nachzuchten. Wildfänge können ihr Gift lange behalten
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen werden zum Wasser getragen**
Eiablage	**Am Boden**
Geschlechtsreif	**5-8 Monate**
Eier pro Gelege	**1-8**
Schlupf	**7-16 Tage**
Larvenzeit	**60-80 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Fertigfutter und unbefruchtete Eier des Weibchens**
Brutpflege	**Bewacht das Gelege, trägt die Kaulquappen und füttert die Kaulquappen mit Eiern**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**21-26 °C**
Temperatur, Nacht	**18-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**70-100 %**
Wasser	**Wasserschale** Tiefe 1-2 cm
UVB	**Optional**
Ernährung	**Kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Paarweise**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein Paar *R. imitator* kann in einem Terrarium von 45 × 45 × 45 cm gehalten werden. Dieses Maß passt für 1-3 Tiere.
TEMPERATUR	Halte das Terrarium tagsüber bei 21-26 °C und nachts bei 18-22 °C. Die Art verträgt 18-27 °C, gedeiht aber am besten bei etwa 21-24 °C, und Temperaturen über 29 °C sind gefährlich.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Luftfeuchtigkeit sollte bei 70-100 % liegen. Strebe fast 100 % morgens und abends und 70-75 % mittags an, damit das Terrarium zwischen dem Sprühen etwas abtrocknen kann; andere Angaben lauten 80-100 %.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Eine flache Wasserschale oder eine Bromelie mit Wasser in den Blattachseln genügt.
LICHT UND UVB	*R. imitator* ist tagaktiv und lebt im Schatten unter dem Kronendach des Waldes. Das Licht ist vor allem für die Pflanzen da. Gib 12-14 Stunden am Tag LED-Licht, zum Beispiel von 8-20 Uhr.
FÜTTERUNG	Das Grundfutter sind kleine Gliederfüßer: flugunfähige Fruchtfliegen (*Drosophila melanogaster*), Springschwänze und kleine Asseln. Große erwachsene Tiere können auch die größere *D. hydei* nehmen.
VERHALTEN UND UMGANG	*R. imitator* ist dreist und tagaktiv und ist oft frei im Terrarium zu sehen. Das Männchen ruft von festen Plätzen, und beide Geschlechter verteidigen das Revier des Paares gegen Artgenossen.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Peru.