herpy

PFEILGIFTFRÖSCHE

Ranitomeya uakarii

Ranitomeya uakarii ist ein sehr kleiner, tagaktiver Pfeilgiftfrosch von 13-16 mm aus dem Amazonasbecken. Er ist schwarz mit roten bis orangefarbenen Streifen, gelben Flanken und blauen Beinen und in der Hobbyhaltung selten. Die Pflege beruht auf den Erfahrungen mit der Gattung, und die Art eignet sich für geübte Halter mit Geduld und einem stabilen Nachschub an winzigen Futtertieren.

Familie: Dendrobatidae Englisch: Red Uakari Poison Frog Früherer Name: *Dendrobates uakarii* Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**13-16 mm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**5-6 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend und bodenbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald**
Hautgift in der Natur	**Schwach**
Hautgift in Menschenobhut	**Keins** Nachzuchten. Wildfänge können ihr Gift lange behalten
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H für 3 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**21-25 °C**
Temperatur, Nacht	**18-21 °C**
Luftfeuchtigkeit	**70-100 %**
Wasser	**Wasserschale** Tiefe 1-2 cm
UVB	**Optional**
Ernährung	**Kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Paarweise oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen werden zum Wasser getragen**
Eiablage	**In Blattachseln (z. B. Bromelien)**
Eier pro Gelege	**2-7**
Schlupf	**10-14 Tage**
Larvenzeit	**60-100 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Algen/Pflanzen und Fertigfutter**
Brutpflege	**Trägt die Kaulquappen**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein Paar oder ein Trio *Ranitomeya uakarii* kann in einem Terrarium von 45 × 45 × 45 cm gehalten werden, und auch 40 × 40 × 40 cm eignet sich für ein Paar oder ein Trio.
TEMPERATUR	Halte das Terrarium tagsüber bei 21-25 °C und nachts bei 18-21 °C. Die Werte sind von der Gattung übernommen, und die Angaben schwanken tagsüber von etwa 21-24 °C bis 25-28 °C.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Luftfeuchtigkeit sollte 70-100 % betragen. Sprühe täglich, sodass die Feuchtigkeit morgens und abends nahe bei 100 % und mittags bei 70-75 % liegt. So kann das Terrarium zwischen dem Sprühen etwas abtrocknen.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Eine flache Wasserschale oder eine Bromelie mit Wasser in den Blattachseln genügt.
LICHT UND UVB	*Ranitomeya uakarii* ist tagaktiv, und das Licht ist vor allem für die Pflanzen da. Biete 12-14 Stunden Licht am Tag mit Leuchtstoffröhren oder LED und Dunkelheit in der Nacht. Es ist nicht dokumentiert, dass die Art UVB braucht.
FÜTTERUNG	Das Grundfutter besteht aus kleinen Gliederfüßern: flugunfähige Fruchtfliegen, Springschwänze, kleine weiße Asseln und frisch geschlüpfte Heimchen.
VERHALTEN UND UMGANG	*Ranitomeya uakarii* ist tagaktiv.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Brasilien, Kolumbien und Peru.