herpy

PFEILGIFTFRÖSCHE

Ranitomeya vanzolinii

Ranitomeya vanzolinii ist ein kleiner, tagaktiver Pfeilgiftfrosch von 17-19 mm aus dem westlichen Amazonasgebiet. Er lebt in den Bäumen und zieht seinen Nachwuchs in Wasser auf, das sich in Bromelien sammelt. Das Weibchen füttert die Kaulquappen mit unbefruchteten Eiern.

Familie: Dendrobatidae Englisch: Brazilian Poison Frog Früherer Name: *Dendrobates vanzolinii* Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**17-19 mm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**5-6 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald und Bergwald**
Hautgift in der Natur	**Schwach**
Hautgift in Menschenobhut	**Keins** Nachzuchten. Wildfänge können ihr Gift lange behalten
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**23-26 °C**
Temperatur, Nacht	**19-23 °C**
Luftfeuchtigkeit	**70-100 %**
Wasser	**Wasserschale** Tiefe 1-2 cm
UVB	**Optional**
Ernährung	**Kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Paarweise oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen werden zum Wasser getragen**
Eiablage	**In Blattachseln (z. B. Bromelien)**
Eier pro Gelege	**1-6**
Schlupf	**10-14 Tage**
Larvenzeit	**60-80 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Fertigfutter und unbefruchtete Eier des Weibchens**
Brutpflege	**Trägt die Kaulquappen und füttert die Kaulquappen mit Eiern**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM
Ein Terrarium von 40 × 40 × 40 cm ist das Minimum für ein Paar *Ranitomeya vanzolinii*, und die Angaben reichen bis 50 × 50 × 50 cm.

TEMPERATUR
Die Tagestemperatur sollte bei 23-26 °C liegen und nachts um 3-4 °C auf 19-23 °C abgesenkt werden. Die Schwankung über das Jahr soll klein sein, 1-2 °C. Ein Wärmefleck ist nicht nötig, und die Art hält keine Winterruhe.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN
Die Luftfeuchtigkeit sollte 70-100 % betragen. Morgens und abends sollte sie nahe bei 100 % liegen, mittags darf sie auf 70-75 % fallen.

WASSER UND WASSERQUALITÄT
Eine Wasserschale ist für die erwachsenen Tiere nicht nötig, aber von Vorteil, und sie kann flach sein, mit 1-2 cm Wasser.

LICHT UND UVB
Der Lichtbedarf von *Ranitomeya vanzolinii* ist bescheiden. Der Frosch braucht gerade genug Licht, um sein Futter zu sehen, und die Pflanzen brauchen mehr.

FÜTTERUNG
Ranitomeya vanzolinii lebt von kleinen, lebenden Gliederfüßern: Fruchtfliegen, Springschwänzen, kleinen tropischen Asseln und frisch geschlüpften Heimchen. Kleine Tiere brauchen kleine Futtertiere.

VERHALTEN UND UMGANG
Ranitomeya vanzolinii ist tagaktiv, aber scheu. In einem dicht bepflanzten Terrarium mit vielen Verstecken zeigt sie sich häufiger als in einem spärlich eingerichteten.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET
Brasilien und Peru.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/pilegiftfroeer/ranitomeya-vanzolinii