herpy

PFEILGIFTFRÖSCHE

Ranitomeya ventrimaculata

Ranitomeya ventrimaculata ist ein kleiner, tagaktiver Pfeilgiftfrosch von unter 18 mm aus dem Regenwald im östlichen Ecuador, im nordöstlichen Peru und im südöstlichen Kolumbien. Im engen Sinn ist er schwarz mit dünnen rosa Streifen und blaugrauem Netzmuster auf Beinen und Bauch. Der Name hat in der Hobbyhaltung jahrzehntelang andere Arten bezeichnet, daher ist es wichtig zu wissen, was die Tiere tatsächlich sind.

Familie: Dendrobatidae Englisch: Amazonian Poison Frog Früherer Name: *Dendrobates ventrimaculatus; Dendrobates minutus ventrimaculatus; Dendrobates duellmani; Ranitomeya duellmani* Veröffentlicht am 15. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**15-17 mm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**5-10 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend und bodenbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald**
Hautgift in der Natur	**Schwach**
Hautgift in Menschenobhut	**Keins** Nachzuchten. Wildfänge können ihr Gift lange behalten
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen werden zum Wasser getragen**
Eiablage	**Am Boden**
Eier pro Gelege	**1-4**
Larvenzeit	**60-80 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Fertigfutter und andere Kaulquappen**
Brutpflege	**Trägt die Kaulquappen**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**21-26 °C**
Temperatur, Nacht	**18-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**70-100 %**
Wasser	**Wasserschale** Tiefe 1-2 cm
UVB	**Optional**
Ernährung	**Kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Paarweise oder in Gruppen**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM
Die Art im engen Sinn ist in Terrarien fast unbekannt, und es gibt keine Haltungserfahrungen, die gerade für sie gelten. Die Zahlen hier sind dieselben wie für die anderen kleinen Ranitomeya.

TEMPERATUR
Halte das Terrarium tagsüber bei 21-26 °C und nachts bei 18-22 °C. Die Zahlen gelten für die kleinen Ranitomeya allgemein: Sie vertragen etwa 18-27 °C und dürfen nie über 29 °C kommen.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN
Die Luftfeuchtigkeit sollte 70-100 % betragen: nahe 100 % morgens und abends und 70-75 % mittags.

WASSER UND WASSERQUALITÄT
Biete den Fröschen eine flache Wasserschale oder einen kleinen Wasserteil mit 1-2 cm Wasser, sodass der kleinste Frosch mit Kopf und Oberkörper über Wasser sitzen kann; die kleinen Pfeilgiftfrösche schwimmen schlecht.

LICHT UND UVB
Die Frösche sind tagaktiv und leben im Schatten des Waldes. Das Licht ist vor allem für die Pflanzen da: 12-14 Stunden am Tag mit LED-Licht sind üblich.

FÜTTERUNG
Ranitomeya ventrimaculata ist so klein, dass sie nur kleine Futtertiere nehmen kann: Springschwänze, flugunfähige Fruchtfliegen (*Drosophila melanogaster*), kleine tropische Asseln und frisch geschlüpfte Heimchen.

VERHALTEN UND UMGANG
Ranitomeya ventrimaculata ist tagaktiv und lebt meist im Laub am Waldboden. Die Männchen rufen mit einem schnellen Summen.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET
Ecuador, Peru und Kolumbien.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/pilegiftfroeer/ranitomeya-ventrimaculata