herpy

SCHWANZLURCHE

Teichmolch

Lissotriton vulgaris

Lissotriton vulgaris ist ein kleiner, anpassungsfähiger Molch von 8-11 cm, der den größten Teil des Jahres an Land lebt und nur zur Fortpflanzung ins Wasser geht. Das Männchen bekommt im Frühjahr einen gewellten Rückenkamm und kräftige Farben. Die Art ist robust in einem kühlen Aquaterrarium mit Winterruhe und legt gern Eier, sodass sich der ganze Lebenszyklus verfolgen lässt.

Familie: Salamandridae Englisch: Smooth Newt Früherer Name: *Triturus vulgaris* Veröffentlicht am 16. November 2026 **Schwaches Hautgift**

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**8-11 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Gewicht	**0,3-5,2 g**
Lebenserwartung	**4-14 Jahre**
Aktiv	**In der Dämmerung und nachts**
Lebensweise	**Semiaquatisch**
Lebensraum	**Feuchtgebiet und gemäßigter Wald und Wiese**
Hautgift	**Schwach** Nach Kontakt die Hände waschen und die Finger von Augen und Mund fernhalten
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**60 × 30 × 30 cm** L × B × H für 4 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**12-20 °C**
Temperatur, Nacht	**8-15 °C**
Luftfeuchtigkeit	**80-100 %**
Wasser	**Aquaterrarium** Tiefe 10-20 cm
Wassertemperatur	**10-20 °C**
UVB	**Nicht nötig**
Winterruhe	**5-10 °C** 8-12 Wochen
Ernährung	**Insekten, kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen) und Würmer/Schnecken**
Haltung	**Paarweise oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Larven im Wasser**
Eiablage	**Im Wasser**
Geschlechtsreif	**24-36 Monate**
Eier pro Saison	**100-500**
Schlupf	**8-35 Tage**
Larvenzeit	**42-120 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Kleine Wassertiere (Daphnien, Mückenlarven)**
Brutpflege	**Keine**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM
Adulte Tiere brauchen sowohl einen Wasser- als auch einen Landteil. Ein Aquaterrarium von 60 × 30 × 30 cm passt für bis zu 4 adulte Tiere, und größer ist besser: Mehr Wasserfläche gibt den Tieren in der Fortpflanzungszeit Platz.

TEMPERATUR
Lissotriton vulgaris liebt Kühle. Die Tagestemperatur beträgt 12-20 °C und die Nachttemperatur 8-15 °C. Etwa 20 °C sind das Höchste, was die Tiere über längere Zeit haben sollten, und sie sind bis hinunter auf etwa 5 °C aktiv.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN
Die weiche Haut trocknet schnell aus, daher muss der Landteil feucht gehalten werden, mit einer Luftfeuchtigkeit von 80-100 %.

WASSER UND WASSERQUALITÄT
Der Wasserteil muss 10-20 cm tief und 10-20 °C warm sein. Verwende entchlortes Leitungswasser, Leitungswasser, das einige Tage gestanden hat, oder Regenwasser; die Art ist beim pH-Wert nicht wählerisch, aber Chlor ist schädlich.

LICHT UND UVB
UVB ist für die Art nicht nötig, denn sie lebt versteckt und ist in der Dämmerung und nachts aktiv. Die Tiere meiden Sonne.

FÜTTERUNG
Lissotriton vulgaris frisst alle kleinen Tiere, die sie verschlucken kann. An Land bekommen adulte Tiere kleine Regenwürmer, kleine Nacktschnecken, Asseln, Enchyträen, Blattläuse, Drosophila und kleine Grillen.

VERHALTEN UND UMGANG
Die Art ist friedlich und kann paarweise oder in Gruppen mit mehr Weibchen als Männchen gehalten werden.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET
Irland, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Deutschland, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, Slowakei, Österreich, Schweiz, Italien, Slowenien, Kroatien, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Serbien, Ukraine, Belarus, Republik Moldau, Russland und Kasachstan.