herpy

SCHWANZLURCHE

Paramesotriton caudopunctatus

Paramesotriton caudopunctatus ist ein kräftiger, fast rein wasserlebender Schwanzlurch von bis zu 16 cm aus den Bergwäldern im südlichen Zentralchina. Der Artname verweist auf die kleinen Flecken am Schwanz. Die Art wächst ungewöhnlich langsam, ist in Gefangenschaft selten und braucht kühles, sauberes Wasser.

Familie: Salamandridae Englisch: Guizhou Warty Newt Veröffentlicht am 16. November 2026 **Schwaches Hautgift**

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**13-16 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**10-15 Jahre**
Aktiv	**In der Dämmerung und nachts**
Lebensweise	**Aquatisch**
Lebensraum	**Regenwald, Bergwald und Feuchtgebiet**
Hautgift	**Schwach** Nach Kontakt die Hände waschen und die Finger von Augen und Mund fernhalten
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**60 × 30 × 35 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**16-22 °C**
Temperatur, Nacht	**14-18 °C**
Luftfeuchtigkeit	**70-90 %**
Wasser	**Aquaterrarium** Tiefe 15-20 cm
UVB	**Nicht nötig**
Ernährung	**Insekten und Würmer/Schnecken**
Haltung	**Paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Larven im Wasser**
Eiablage	**Im Wasser**
Geschlechtsreif	**108-120 Monate**
Eier pro Saison	**20-115**
Gelege pro Jahr	**1**
Schlupf	**21-56 Tage** bei 18-25 °C
Larvenzeit	**80-110 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Andere Larven und kleine Wassertiere (Daphnien, Mückenlarven)**
Brutpflege	**Keine**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Potenziell gefährdet (NT)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Haltung von *Paramesotriton caudopunctatus* ist nur wenig bekannt, und die Art ist in Gefangenschaft selten.
TEMPERATUR	*Paramesotriton caudopunctatus* muss kühl gehalten werden: 16-22 °C am Tag und 14-18 °C in der Nacht, und das Wasser darf nicht wärmer als 22 °C werden.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	*Paramesotriton caudopunctatus* lebt fast ausschließlich im Wasser, daher spielt die Luftfeuchtigkeit eine geringe Rolle; 70-90 % sind gut. Ein Landteil muss feucht sein, solange die Tiere ihn nutzen.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Das Wasser muss 15-20 cm tief sein. Verwende entchlortes Leitungswasser oder Quellwasser. Das Wasser muss sauber sein, und extreme pH- und Härtewerte werden vermieden.
LICHT UND UVB	*Paramesotriton caudopunctatus* braucht kein starkes Licht. Eine einzelne Leuchtstoffröhre oder LED-Röhre an einer Zeitschaltuhr sorgt für einen festen Tagesrhythmus von etwa 12 Stunden. UVB ist nicht notwendig.
FÜTTERUNG	*Paramesotriton caudopunctatus* frisst dasselbe wie der Rest der Gattung: zerkleinerte Regenwürmer, Grillen, frisch gehäutete Mehlwürmer, Schaben und Stücke von Garnelen.
VERHALTEN UND UMGANG	*Paramesotriton caudopunctatus* ist aktiver als die meisten Arten der Gattung. Junge Landtiere dagegen sind sehr versteckt und selten zu sehen.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	China.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/salamandre/paramesotriton-caudopunctatus