herpy

SCHWANZLURCHE

Tylototriton asperrimus

Tylototriton asperrimus ist ein dunkler, warziger Krokodilmolch von 12-15 cm mit knotigen Rippenhöckern und kräftigen Rückenkämmen. Die Art lebt in feuchten Berggegenden der chinesischen Provinz Guangxi und hat einer ganzen Gruppe nah verwandter Krokodilmolche ihren Namen gegeben, die erst vor Kurzem als eigene Arten abgetrennt wurden.

Familie: Salamandridae Englisch: Black Knobby Newt Früherer Name: *Echinotriton asperrimus; Pleurodeles asperrimus* Veröffentlicht am 16. November 2026

Schwaches Hautgift

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**12-15 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**15-25 Jahre**
Aktiv	**In der Dämmerung und nachts**
Lebensweise	**Bodenbewohnend**
Lebensraum	**Bergwald und Feuchtgebiet**
Hautgift	**Schwach** Nach Kontakt die Hände waschen und die Finger von Augen und Mund fernhalten
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H für 3 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**20-24 °C**
Temperatur, Nacht	**18-21 °C**
Luftfeuchtigkeit	**80-100 %**
Wasser	**Wasserteil** Tiefe 1-5 cm
UVB	**Optional**
Winterruhe	**8-12 °C** 8-12 Wochen
Ernährung	**Insekten und Würmer/Schnecken**
Haltung	**Paarweise oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Larven im Wasser**
Eiablage	**Am Boden**
Eier pro Saison	**30-80**
Schlupf	**20-36 Tage** bei 22-24 °C
Larvenzeit	**50-110 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Andere Larven und kleine Wassertiere (Daphnien, Mückenlarven)**
Brutpflege	**Keine**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Potenziell gefährdet (NT)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Haltung von *Tylototriton asperrimus* ist nur wenig bekannt.
TEMPERATUR	Im Sommer wird das Terrarium tagsüber bei 20-24 °C und nachts bei 18-21 °C gehalten, was dem Sommer im Verbreitungsgebiet entspricht.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80-100 %. Das Terrarium wird täglich mit einer Blumenspritze besprüht, und es muss sowohl feuchtere als auch trockenere Zonen geben, damit die Luft nicht steht.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Der Wasserteil braucht weiches, schwach saures Wasser; Regenwasser oder Osmosewasser eignet sich. Der pH-Wert des Wassers ist für *Tylototriton asperrimus* nicht dokumentiert; *Tylototriton ziegleri* wird bei pH 6,4-6,8 gehalten.
LICHT UND UVB	Das Licht hat für die Tiere keine besondere Bedeutung und richtet sich nach den Pflanzen: LED-Streifen oder Leuchtstoffröhren, 12 Stunden im Sommer und 10-11 Stunden im Winter. UVB ist für die versteckt lebende Art nicht nötig.
FÜTTERUNG	Adulte Tiere bekommen etwa zweimal pro Woche Enchyträen, Grillen, Heimchen, Wachsmottenlarven, Regenwürmer und Asseln in passender Größe. Im Winter fressen sie unregelmäßig und deutlich weniger.
VERHALTEN UND UMGANG	Bei den nah verwandten Arten leben die Tiere sehr versteckt und sind meist beim Füttern oder dann zu sehen, wenn die Männchen im Wasser sind.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	China.