herpy

SCHWANZLURCHE

Tylototriton kweichowensis

Tylototriton kweichowensis ist ein kräftiger, schwarzbrauner Krokodilmolch von 15-21 cm mit drei breiten orangen bis rötlichen Streifen entlang des Körpers. Sie lebt an Land in den Bergen von Guizhou und Yunnan und geht hauptsächlich zur Fortpflanzung ins Wasser. Am besten wird sie in einem großen Terrarium mit Land- und Wasserteil gehalten.

Familie: Salamandridae Englisch: Guizhou Crocodile Newt Früherer Name: *Pleurodeles kweichowensis* Veröffentlicht am 16. November 2026

Schwaches Hautgift

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**15-21 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**10-20 Jahre**
Aktiv	**In der Dämmerung und nachts**
Lebensweise	**Bodenbewohnend und semiaquatisch**
Lebensraum	**Bergwald und Feuchtgebiet**
Hautgift	**Schwach** Nach Kontakt die Hände waschen und die Finger von Augen und Mund fernhalten
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**90 × 45 × 45 cm** L × B × H für 3 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**18-25 °C**
Temperatur, Nacht	**15-20 °C**
Luftfeuchtigkeit	**70-90 %**
Wasser	**Aquaterrarium** Tiefe 10-15 cm
UVB	**Nicht nötig**
Ernährung	**Insekten und Würmer/Schnecken**
Haltung	**Paarweise oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Larven im Wasser**
Eiablage	**Auf Blättern über dem Wasser**
Eier pro Saison	**50-150**
Gelege pro Jahr	**1**
Schlupf	**10-12 Tage** bei 25 °C
Larvenzeit	**80-100 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Kleine Wassertiere (Daphnien, Mückenlarven)**
Brutpflege	**Keine**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Gefährdet (VU)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	*Tylototriton kweichowensis* braucht ein großes Terrarium, weil die Tiere groß und schwer sind, eine feste Landfläche mit einem Versteck für jedes Tier brauchen und genug Wasser für die Nachzucht und einen Filter haben müssen.
TEMPERATUR	Die Art gedeiht bei normaler Zimmertemperatur: 23-26 °C im Sommer und 15-20 °C im Winter. Die Tagestemperatur im Kasten beträgt 18-25 °C und die Nachttemperatur 15-20 °C.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Luftfeuchtigkeit muss hoch sein, der Boden aber nicht nass; 70-90 % sind eine Schätzung. Der Landteil wird feucht gehalten, ohne matschig zu werden, und ein Teil des Bodens darf gern trockener sein.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Der Wasserteil nimmt etwa die Hälfte des Terrariums ein. Die Tiefe ist für die Art nicht dokumentiert; 10-15 cm sind von *Tylototriton verrucosus* übernommen.
LICHT UND UVB	UVB ist nicht nötig, und die Art ist am aktivsten in der Dämmerung und nachts.
FÜTTERUNG	Adulte Tiere bekommen zerkleinerte Regenwürmer, Grillen und andere Beutetiere in passender Größe. Wachsmottenlarven und andere fette Larven werden gern genommen, sollen aber nicht das Grundfutter sein.
VERHALTEN UND UMGANG	Die Art ist langsam und unbeholfen. 2-3 Tiere können zusammen gehalten werden, wenn es für jedes Tier genug Verstecke gibt.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	China.