herpy

SCHWANZLURCHE

Tylototriton vietnamensis

Tylototriton vietnamensis ist ein kleiner, dunkler Krokodilmolch von 12-17 cm aus einigen wenigen Waldresten im Norden Vietnams. Das Tier ist schwarz bis braungrau, mit klar gelben bis orangeroten Fingern, Zehen und Schwanzunterseite, und lebt überwiegend an Land. Die Art wurde erst 2005 beschrieben und ist in der Natur gefährdet.

Familie: Salamandridae Englisch: Vietnam Crocodile Newt Veröffentlicht am 16. November 2026 **Schwaches Hautgift**

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**12-17 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Gewicht	**7-18 g**
Lebenserwartung	**10-20 Jahre**
Aktiv	**In der Dämmerung und nachts**
Lebensweise	**Bodenbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald**
Hautgift	**Schwach** Nach Kontakt die Hände waschen und die Finger von Augen und Mund fernhalten
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H für 3 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**23-25 °C**
Temperatur, Nacht	**23-25 °C**
Luftfeuchtigkeit	**70-100 %**
Wasser	**Wasserteil** Tiefe 1-5 cm
UVB	**Nicht nötig**
Ernährung	**Insekten und Würmer/Schnecken**
Haltung	**Paarweise oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Larven im Wasser**
Eiablage	**Am Boden**
Geschlechtsreif	**18 Monate**
Eier pro Saison	**5-178**
Gelege pro Jahr	**1-2**
Schlupf	**28 Tage** bei 22-24 °C
Larvenzeit	**60-180 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Kleine Wassertiere (Daphnien, Mückenlarven)**
Brutpflege	**Keine**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Gefährdet (VU)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	*Tylototriton vietnamensis* wird in einem Regenwaldterrarium mit Wasserteil gehalten.
TEMPERATUR	Von März bis Oktober wird das Terrarium bei 23-25 °C gehalten. Eine gesonderte Nachttemperatur ist nicht dokumentiert, daher zeigt der Kasten dasselbe Intervall rund um die Uhr.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Luftfeuchtigkeit beträgt 70-100 % in der warmen Jahreszeit. Das Terrarium wird täglich mit einer Blumenspritze oder einer Beregnungsanlage besprüht; die Menge hängt von Größe und Belüftung des Terrariums ab.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Der Wasserteil ist 1-5 cm tief und nimmt ein Viertel der Grundfläche ein. Das Wasser ist weich und schwach sauer (pH 6,4-6,8) wie in der Natur. Biete immer einen leichten Ausstieg mit Steinen, Kies oder einem flachen Ufer.
LICHT UND UVB	Das Licht hat für die Tiere keine besondere Bedeutung, und sie mögen kein starkes Licht. Die Beleuchtung kann sich nach den Pflanzen richten, mit LED-Leisten oder Leuchtstoffröhren, oder einfach dem Licht, das in den Raum fällt.
FÜTTERUNG	Adulte Tiere bekommen Regenwürmer, Grillen und Wachsmottenlarven, und die Futtertiere werden selbst abwechslungsreich gefüttert und mit Vitamin- und Mineralzusatz bestäubt.
VERHALTEN UND UMGANG	Die Tiere suchen Verstecke und mögen kein grelles Licht. Die Männchen gehen in der Fortpflanzungszeit ins Wasser, werden heller und bekommen eine deutlich andere Haut, und sie warten auf die Weibchen.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Vietnam.