herpy

SCHWANZLURCHE

Tylototriton wenxianensis

Tylototriton wenxianensis ist ein mittelgroßer, fast ganz schwarzer Krokodilmolch mit orangen Zehenspitzen und Schwanzkante. Er lebt versteckt in Wald und Gebüsch in den Bergen Zentralchinas und geht nur zur Fortpflanzung ins Wasser; die Eier werden an Land abgelegt. Über die Haltung ist nur wenig bekannt, daher beruht die Anleitung auf nahen Verwandten.

Familie: Salamandridae Englisch: Wenxian Knobby Newt Veröffentlicht am 16. November 2026 **Schwaches Hautgift**

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**13-16 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**10-20 Jahre**
Aktiv	**In der Dämmerung und nachts**
Lebensweise	**Bodenbewohnend und semiaquatisch**
Lebensraum	**Bergwald und Feuchtgebiet**
Hautgift	**Schwach** Nach Kontakt die Hände waschen und die Finger von Augen und Mund fernhalten
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H für 3 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**18-24 °C**
Temperatur, Nacht	**15-20 °C**
Luftfeuchtigkeit	**70-90 %**
Wasser	**Wasserteil** Tiefe 3-5 cm
UVB	**Nicht nötig**
Ernährung	**Insekten und Würmer/Schnecken**
Haltung	**Paarweise oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Larven im Wasser**
Eiablage	**Am Boden**
Eier pro Saison	**30-80**
Schlupf	**20-36 Tage** bei 22-24 °C
Larvenzeit	**80-130 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Andere Larven und kleine Wassertiere (Daphnien, Mückenlarven)**
Brutpflege	**Keine**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Gefährdet (VU)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Haltung von *Tylototriton wenxianensis* ist nur wenig bekannt.
TEMPERATUR	Im Sommer wird das Terrarium bei 22-24 °C gehalten, im Winter bei etwa 18 °C, und kurzzeitig niedrigere Temperaturen schaden nicht; so wird *T. ziegleri* gehalten.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Im Sommer wird das Terrarium täglich besprüht, sodass Moos und Boden feucht bleiben; 70-90 % Luftfeuchtigkeit sind eine Schätzung.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Das Wasser ist weich und leicht sauer, pH 6,4-6,8, und höchstens etwa 5 cm tief.
LICHT UND UVB	UVB ist nicht nötig. Die Art lebt versteckt und mag kein starkes Licht; das Licht dient in erster Linie den Pflanzen. Gib im Sommer etwa 12 Stunden Licht und im Winter 10-11 Stunden.
FÜTTERUNG	Die Nahrung ist für die Art nicht dokumentiert. Die Gattung nimmt übliches Salamanderfutter: Regenwürmer, Grillen, Asseln und Wachsmottenlarven.
VERHALTEN UND UMGANG	Das Verhalten in menschlicher Obhut ist für die Art nicht dokumentiert. Bei *T. ziegleri* leben die Tiere sehr versteckt, und sie können einzeln, paarweise oder in kleinen Gruppen gehalten werden.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	China.