herpy

SCHILDKRÖTEN

Spornschildkröte

Centrochelys sulcata

Centrochelys sulcata ist die größte Landschildkröte des afrikanischen Festlands: Der Panzer wird 50-85 cm lang, das Gewicht bis zu 90 kg, und das Tier kann 50-80 Jahre leben. Die Jungtiere sind klein, wachsen aber schnell, und erwachsene Tiere brauchen im Winter einen beheizten Raum von mehr als 20 m², im Sommer ein großes Außengehege und einen Halter, der die Aufgabe jahrzehntelang tragen kann.

Familie: Testudinidae Englisch: African Spurred Tortoise Früherer Name: *Geochelone sulcata; Testudo sulcata*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**50-85 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Gewicht	**30.000-90.000 g**
Lebenserwartung	**50-80 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber und in der Dämmerung**
Lebensweise	**Bodenbewohnend und grabend**
Lebensraum	**Halbwüste und Savanne**
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**640 × 320 × 120 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**24-32 °C**
Sonnenplatz	**38-41 °C**
Temperatur, Nacht	**21-23 °C**
Luftfeuchtigkeit	**40-80 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Notwendig** Ferguson-Zone 4
Ernährung	**Pflanzen**
Haltung	**Einzeln oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**120-180 Monate**
Gelegegröße	**15-40 Eier**
Gelege pro Jahr	**2-3**
Inkubation	**90-120 Tage** bei 30-31 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Stark gefährdet (EN)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM
Zuerst muss der Platz geklärt werden. Eine verbreitete Mindestregel für Landschildkröten ist eine Länge vom 8-Fachen und eine Breite vom 4-Fachen der Panzerlänge des größten Tieres.

TEMPERATUR
Die Lufttemperatur sollte tagsüber bei 24-32 °C liegen, mit einem Sonnenplatz von 38-41 °C für Jungtiere, und nachts bei 21-23 °C.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER
Obwohl die Art aus einem trockenen Gebiet stammt, dürfen junge Tiere nicht ganz trocken gehalten werden: In der Natur schlüpfen die Jungtiere in der Regenzeit und verbringen viel Zeit in feuchten Höhlen.

WASSER UND WASSERQUALITÄT
Es muss immer eine große, flache und stabile Schale mit frischem Wasser stehen, eingegraben, damit das Tier hinein- und herauskommen kann. Das Wasser darf dem Tier höchstens bis zum Knie reichen.

LICHT UND UVB
Die Art ist tagaktiv und braucht drinnen das ganze Jahr über sowohl kräftiges Licht als auch UVB (Ferguson-Zone 4), mit einem UV-Index von etwa 4-6 am Sonnenplatz.

FÜTTERUNG
C. sulcata ist Pflanzenfresser und braucht eine faserreiche und eiweißarme Kost.

VERHALTEN UND UMGANG
Die Art ist ruhig und träge, aber kein Haustier zum Handling. Das Tier wird gestresst, wenn man es hochhebt, und ein erwachsenes Tier von 50-90 kg kann von einer einzelnen Person nicht angehoben werden.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET
Äthiopien, Eritrea, Sudan, Südsudan, Tschad, Niger, Mali, Mauretanien, Senegal, Zentralafrikanische Republik und Kamerun.