herpy

SCHILDKRÖTEN

Amboina-Scharnierschildkröte

Cuora amboinensis

Cuora amboinensis ist eine mittelgroße, fast ganz im Wasser lebende Schildkröte mit Scharnierplastron aus dem Tiefland Südostasiens. Der Panzer wird etwa 20-25 cm lang, und das Tier kann über 30 Jahre alt werden. Die Art verlangt ein großes, gefiltertes Becken mit verhältnismäßig niedrigem Wasser, einen warmen Sonnenplatz, UVB und Wärme das ganze Jahr über, denn sie hält nie Winterruhe.

Familie: Geoemydidae Englisch: Southeast Asian Box Turtle Früherer Name: *Cistudo amboinensis; Cyclemys amboinensis*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**18-25 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**25-38 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Semiaquatisch**
Lebensraum	**Regenwald und Feuchtgebiet**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**130 × 65 × 60 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**25-30 °C**
Sonnenplatz	**30-35 °C**
Temperatur, Nacht	**22-25 °C**
Luftfeuchtigkeit	**60-80 %**
Wasser	**Aquaterrarium** Tiefe 15-25 cm
Wassertemperatur	**25-28 °C**
UVB	**Notwendig** Ferguson-Zone 2
Ernährung	**Insekten, Fertigfutter, Pflanzen, Wirbeltiere und Würmer/Schnecken**
Haltung	**Einzeln, paarweise oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**48-60 Monate**
Gelegegröße	**1-5 Eier**
Gelege pro Jahr	**1-3**
Inkubation	**70-100 Tage** bei 26-30 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Stark gefährdet (EN)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Halte das Tier in einem großen Aquarium oder Becken, nicht in einem gewöhnlichen Terrarium.
TEMPERATUR	Das Wasser soll das ganze Jahr über 25-28 °C haben. Verwende einen Heizstab mit Schutzkorb und Thermostat und miss mit einem digitalen Thermometer.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Feuchtigkeit der Schildkröte ist das Wasser selbst, daher ist die relative Luftfeuchtigkeit nicht entscheidend und für die Art nicht näher dokumentiert; 60-80 % im Raum sind passend.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Das Wasser ist der Aufenthaltsort des Tieres, deshalb muss es sauber, warm und verhältnismäßig niedrig sein. Erwachsene Tiere gedeihen in 15-25 cm Wasser mit niedrigeren Zonen. Die Temperatur beträgt 25-28 °C.
LICHT UND UVB	UVB ist nötig, damit das Tier Vitamin D3 bilden und Kalzium aufnehmen kann.
FÜTTERUNG	*C. amboinensis* ist Allesfresser, bei erwachsenen Tieren mit Schwerpunkt auf Pflanzen. In der Natur frisst sie Pflanzen, Früchte, Samen, Pilze und Würmer an Land sowie Pflanzen, Insekten und Weichtiere im Wasser.
VERHALTEN UND UMGANG	*C. amboinensis* ist scheu und ruhig und kein Tier zum Handling. Das Tier zieht sich in den Panzer zurück und schließt das Plastron, wenn es erschrickt.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Indien, Bangladesch, Myanmar, Thailand, Laos, Kambodscha, Vietnam, Malaysia, Singapur, Indonesien und Philippinen.