herpy

SCHILDKRÖTEN

Bell's Hinge-back Tortoise

Kinixys belliana

Kinixys belliana ist eine mittelgroße afrikanische Landschildkröte mit länglichem Panzer und einem beweglichen Scharnier hinten, mit dem sich der Panzer über Hinterbeinen und Schwanz schließen lässt. Der Panzer ist 15-22 cm lang. Die Art lebt in der Savanne mit deutlicher Regen- und Trockenzeit, braucht stabile Wärme und eine gewisse Feuchtigkeit und gerät leicht in Stress. Neu importierte Tiere tragen oft viele Parasiten.

Familie: Testudinidae Früherer Name: *Cinixys belliana; Kinixys schoensis*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**15-22 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**30-50 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Bodenbewohnend**
Lebensraum	**Savanne**
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**160 × 80 × 40 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**28-32 °C**
Sonnenplatz	**32-35 °C**
Temperatur, Nacht	**22-24 °C**
Luftfeuchtigkeit	**60-80 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Notwendig** Ferguson-Zone 2
Ernährung	**Insekten, Obst, Pflanzen und Würmer/Schnecken**
Haltung	**Einzeln oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**1-6 Eier**
Gelege pro Jahr	**1-2**
Inkubation	**105-200 Tage** bei 28-31 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Nicht beurteilt (NE)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM

Es gibt nur wenig gesichertes Wissen über die Haltung von *Kinixys belliana*, weil ein großer Teil des älteren Wissens aus der Zeit stammt, als mehrere Arten als eine galten.

TEMPERATUR

Das Tier muss warm gehalten werden. Tagsüber sollten es 28-32 °C sein, und der Sonnenplatz hat 32-35 °C, gemessen am Boden. Die Nachttemperatur ist für die Art nicht dokumentiert; 22-24 °C passen zu einem tropischen Klima.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER

Als Savannenart ist *K. belliana* weniger feuchtigkeitsbedürftig als die Waldarten *Kinixys homeana* und *Kinixys erosa*, mag aber Feuchtigkeit und muss regelmäßig besprüht werden.

LICHT UND UVB

K. belliana ist tagaktiv, aber am aktivsten früh und spät am Tag, wenn das Licht schwach ist. Sonnenlicht ist das Beste, doch im Haus ist UVB-Licht nötig: UV-Index 2,0-3,0 am Sonnenplatz (Ferguson-Zone 2).

FÜTTERUNG

K. belliana ist ein Allesfresser, und Jungtiere sind fast ausschließlich Fleischfresser.

VERHALTEN UND UMGANG

Die Art ist scheu und zieht sich in den Panzer zurück oder gräbt sich ein, wenn sie gestört wird. Sie ist am aktivsten früh am Morgen und spät am Tag.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET

Angola, Burundi, Zentralafrikanische Republik, Kongo-Kinshasa, Eritrea, Äthiopien, Kenia, Ruanda, Somalia, Südsudan, Sudan, Uganda, Tansania und Malawi.