herpy

SCHILDKRÖTEN

Carolina-Dosenschildkröte

Terrapene carolina

Terrapene carolina ist eine kleine, hochgewölbte, landlebende Sumpfschildkröte aus dem östlichen Nordamerika. Der Bauchpanzer hat ein Scharnier, sodass sich das Tier vollständig im Panzer einschließen kann. Die Art ist tagaktiv, ein Allesfresser und sehr langlebig, braucht aber Feuchtigkeit, ein großes Gehege, ruhige Pflege und in der Regel eine sorgfältig gesteuerte Winterruhe.

Familie: Emydidae Englisch: Common Box Turtle

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**11-20 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**40-50 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Bodenbewohnend**
Lebensraum	**Feuchtgebiet und gemäßigter Wald und Wiese**
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**160 × 80 × 40 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**21-24 °C**
Sonnenplatz	**29-31 °C**
Temperatur, Nacht	**10-20 °C**
Luftfeuchtigkeit	**60-80 %**
Wasser	**Wasserschale** Tiefe 2-5 cm
UVB	**Notwendig** Ferguson-Zone 2
Ernährung	**Insekten, Obst, Fertigfutter, Pflanzen und Würmer/Schnecken**
Haltung	**Einzeln oder ein Männchen mit mehreren Weibchen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**3-8 Eier**
Inkubation	**50-90 Tage** bei 26-28 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Gefährdet (VU)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	*Terrapene carolina* gedeiht am besten in einem großen, sicheren Freigehege, und ein großes Gehege ist immer besser als ein kleines.
TEMPERATUR	Drinnen soll es einen Sonnenplatz mit 29-31 °C und eine kühle Zone mit 21-24 °C geben.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	*T. carolina* stammt aus feuchten Lebensräumen und gedeiht bei einer durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit von 60-80 %, die nie unter ca. 50 % sinken darf.
LICHT UND UVB	*T. carolina* ist tagaktiv und braucht kräftiges Licht und UVB, um Vitamin D3 zu bilden. Verwende eine T5-HO-UVB-Röhre von ca. 6 % über dem Sonnenplatz, sodass sie die Wärmelampen überlappt.
FÜTTERUNG	*T. carolina* ist ein Allesfresser. In den ersten 5-6 Jahren sind junge Tiere überwiegend Fleischfresser, während adulte Tiere mehr pflanzliche Kost fressen.
VERHALTEN UND UMGANG	*T. carolina* ist scheu und schlecht zum Hochnehmen geeignet. Viele Tiere lernen jedoch ihren Halter kennen, nehmen Futter aus den Fingern und genießen eine sanfte Panzermassage.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Vereinigte Staaten, Mexiko und Kanada.