herpy

SCHLANGEN

Black Kingsnake

Lampropeltis nigra

Lampropeltis nigra ist eine mittelgroße bis große Königsnatter aus dem Osten der USA, schwarz, und im südlichen Teil des Verbreitungsgebiets trägt jede Schuppe einen kleinen gelben oder weißen Fleck. Sie wird 90-120 cm lang, frisst Nagetiere, Eidechsen, Frösche und andere Schlangen und ist robust und leicht zu pflegen. Sie wird einzeln in einem Bodenterrarium mit Wärmeplatz und mäßiger Luftfeuchtigkeit gehalten und kann über 20 Jahre alt werden.

Familie: Colubridae Früherer Name: *Lampropeltis getula nigra; Ophibolus getulus niger*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**90-120 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**15-25 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber und in der Dämmerung**
Lebensweise	**Bodenbewohnend**
Lebensraum	**Feuchtgebiet und gemäßigter Wald und Wiese**
Schwierigkeitsgrad	**Einsteiger**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**21-28 °C**
Sonnenplatz	**29-32 °C**
Temperatur, Nacht	**18-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**40-60 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 2
Ernährung	**Wirbeltiere**
Haltung	**Einzeln**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**5-15 Eier**
Inkubation	**60-70 Tage** bei 26-29 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Haltung von *Lampropeltis nigra* gibt es wenig artspezifisches Wissen.
TEMPERATUR	Das Tier reguliert seine Temperatur, indem es zwischen warmen und kalten Stellen wechselt, daher braucht das Terrarium ein deutliches Gefälle.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Luftfeuchtigkeit soll bei 40-60 % liegen, gemessen mit einem digitalen Hygrometer in der Mitte des Terrariums. Sie ist am kalten Ende und nachts höher und am warmen Ende niedriger, und das ist normal.
LICHT UND UVB	Die Art ist am aktivsten am Tag und sonnt sich in der Natur. Sie kann ohne UVB auskommen, aber UVB wird für das beste Wohlergehen empfohlen. Das passt zu Ferguson-Zone 2.
FÜTTERUNG	*L. nigra* ist ein Fleischfresser und braucht ganze Beutetiere. Mäuse sind das Standardfutter, und wenn das Tier wächst, werden junge Ratten verwendet.
VERHALTEN UND UMGANG	*L. nigra* ist robust und verträglich. Gib einem neuen Tier etwa 2 Wochen Ruhe, und beginne erst mit dem Handling, wenn es regelmäßig frisst.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Vereinigte Staaten.