herpy

SCHLANGEN

Östliche Dreiecksnatter

Lampropeltis triangulum

Lampropeltis triangulum ist eine schlanke, heimliche Natter aus dem östlichen Nordamerika. Der Name umfasste lange eine ganze Gruppe farbenprächtiger Schlangen, und viele der unter diesem Namen verkauften Tiere gehören heute zu anderen Arten. Die Schlange ist nachtaktiv, ruhig und leicht zu halten, ernährt sich aber von Nagern und darf nicht mit anderen Schlangen zusammenleben.

Familie: Colubridae Englisch: Eastern milksnake

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**55-115 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**15-20 Jahre**
Aktiv	**In der Dämmerung und nachts**
Lebensweise	**Bodenbewohnend**
Lebensraum	**Gemäßigter Wald und Wiese**
Schwierigkeitsgrad	**Einsteiger**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**120 × 60 × 45 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**23-27 °C**
Sonnenplatz	**29-32 °C**
Temperatur, Nacht	**21-23 °C**
Luftfeuchtigkeit	**40-60 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Optional**
Winterruhe	**11-13 °C** 10-12 Wochen
Ernährung	**Wirbeltiere**
Haltung	**Einzeln**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**36-48 Monate**
Gelegegröße	**2-24 Eier**
Gelege pro Jahr	**1**
Inkubation	**58-65 Tage** bei 27-29 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Eine adulte *Lampropeltis triangulum* braucht ein Terrarium von mindestens 120 × 60 × 45 cm. Kleine Tiere unter 90 cm kommen mit 90 × 45 × 45 cm aus.
TEMPERATUR	*Lampropeltis triangulum* ist nachtaktiv und wärmt sich meist unter Steinen und anderen Gegenständen, die von der Sonne aufgeheizt wurden, sonnt sich aber gelegentlich offen.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Eine relative Luftfeuchtigkeit von 40-60 % ist angemessen. Sie darf auf der kühlen Seite und nachts gern höher und auf der warmen Seite niedriger sein. Miss in der Mitte des Terrariums mit einem digitalen Hygrometer.
LICHT UND UVB	Die Art ist nachtaktiv und braucht kein starkes Licht. UVB ist nicht notwendig, kann aber nützlich sein.
FÜTTERUNG	Adulte *Lampropeltis triangulum* werden mit Mäusen und jungen Ratten gefüttert, und große Tiere nehmen kleine bis mittelgroße Ratten.
VERHALTEN UND UMGANG	*Lampropeltis triangulum* ist in der Regel ruhig und verträgt Handling gut, aber einzelne Tiere sind nervös und beißen.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Kanada und Vereinigte Staaten.