herpy

SCHLEICHEN

Fringed Arboreal Alligator Lizard

Abronia fimbriata

Abronia fimbriata ist eine braune, baumbewohnende Alligatorschleiche mit dornartigen Schuppen über dem Ohr, die in den Nebelwäldern des nordöstlichen Hochlands von Guatemala lebt. Sie wird etwa 25-35 cm lang, bringt lebende Junge zur Welt und frisst Insekten. Sie braucht ein hohes, gut belüftetes Terrarium mit Moos und Bromelien sowie kühle Temperaturen. Die Art ist bedroht, und die Haltung ist nur spärlich dokumentiert.

Familie: Anguidae Früherer Name: *Barissia fimbriata; Gerrhonotus fimbriatus*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**25-35 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**10-20 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend**
Lebensraum	**Bergwald**
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**50 × 50 × 75 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**20-27 °C**
Sonnenplatz	**26-30 °C**
Temperatur, Nacht	**10-18 °C**
Luftfeuchtigkeit	**60-80 %**
Wasser	**Keine Wasserschale**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 2
Ernährung	**Insekten und Würmer/Schnecken**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Lebendgebärend**
Geschlechtsreif	**24-36 Monate**
Wurfgröße	**4 Jungtiere**
Gelege pro Jahr	**1**
Tragzeit	**180-240 Tage**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang I**
EU-Anhang	**Anhang A**
IUCN	**Stark gefährdet (EN)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM

Die Haltung von *Abronia fimbriata* ist nur spärlich dokumentiert, und die Angaben hier sind von der nah verwandten *Abronia graminea* übernommen, der am besten bekannten Art der Gattung.

TEMPERATUR

Abronia fimbriata verträgt keine Hitze. Die Tagestemperatur soll bei 20-27 °C liegen, und der Sonnenplatz unter einem schwachen Spot darf 26-30 °C warm sein. Das Tier ist bei 24-27 °C am aktivsten.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER

Die relative Luftfeuchtigkeit soll bei 60-80 % liegen, mit den höchsten Werten nachts und nach dem Sprühen.

LICHT UND UVB

Die Art ist tagaktiv und braucht UVB. Am besten ist natürliches, ungefiltertes Sonnenlicht, z. B. in einem Gitterkasten im Freien bei trockenem Wetter im Sommer, mit Schatten und kühlem Untergrund, damit das Tier ausweichen kann.

FÜTTERUNG

Abronia fimbriata ernährt sich von Insekten und anderen Kleintieren. Biete Grillen, Heuschrecken, Mehlwürmer, Schaben, Schnecken, Spinnen und weiche Larven an, z.

VERHALTEN UND UMGANG

Die Art ist ruhig und scheu. Das Tier verbringt den größten Teil des Tages still auf einem Ast oder in einer Bromelie und sonnt sich nur kurz. Es ist kein Tier, das in die Hand genommen werden soll.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET

Guatemala.