herpy

SCHLEICHEN

Wiegmann's Alligator Lizard

Gerrhonotus liocephalus

Gerrhonotus liocephalus ist eine kräftige, bräunliche Alligatorschleiche mit hellen Querbändern, die in Wäldern und Gebüsch im Hochland des südlichen Mexiko lebt. Sie wird 30-50 cm lang, ist tagaktiv, klettert gut und legt Eier. Über die Haltung genau dieser Art ist nur wenig bekannt; das meiste stützt sich auf die nahe verwandte *Gerrhonotus infernalis* aus Texas und dem nordöstlichen Mexiko.

Familie: Anguidae

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**30-50 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**10-15 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend und bodenbewohnend**
Lebensraum	**Bergwald**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**90 × 60 × 60 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**24-29 °C**
Sonnenplatz	**35-40 °C**
Temperatur, Nacht	**15-21 °C**
Luftfeuchtigkeit	**40-70 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 2
Ernährung	**Insekten und Würmer/Schnecken**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**18-36 Monate**
Gelegegröße	**5-31 Eier**
Gelege pro Jahr	**1**
Inkubation	**50-70 Tage** bei 24-26 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Haltung von *Gerrhonotus liocephalus* ist nur wenig bekannt.
TEMPERATUR	Die Lufttemperatur im Terrarium sollte tagsüber 24-29 °C betragen, mit einem Sonnenplatz von 35-40 °C unter Halogenstrahlern, an dem sich das Tier aufwärmen kann. Nachts soll es kühler sein, etwa 15-21 °C.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Luftfeuchtigkeit sollte mäßig sein, etwa 40-70 %, mit höherer Feuchtigkeit in den Verstecken. Der Wert ist eine Schätzung auf Grundlage des Klimas.
LICHT UND UVB	Die Art ist tagaktiv und braucht kräftiges Licht und UVB. Verwende eine T5-HO-Röhre für UVB, sodass der UV-Index im Terrarium von 0 bis 3 reicht, entsprechend Ferguson-Zone 2, und das Tier dem UV-Licht ausweichen kann.
FÜTTERUNG	*Gerrhonotus liocephalus* ernährt sich von Insekten und anderen Kleintieren und jagt aktiv.
VERHALTEN UND UMGANG	Die Art ist scheu, aber neugierig und kann sehr ruhig werden. Sie sonnt sich auf Ästen und Steinen und jagt, indem sie sich an die Beute anschleicht, den Vorderkörper S-förmig krümmt und zuschnappt.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Mexiko.