herpy

SCHLEICHEN

Eastern Glass Lizard

Ophisaurus ventralis

Ophisaurus ventralis ist eine lange, beinlose Glasschleiche aus den Küstenebenen des Südostens der USA. Sie wird bis zu etwa 108 cm lang, wovon mehr als zwei Drittel auf den Schwanz entfallen, und lebt versteckt in feuchten, sandigen Wäldern und Wiesen. Sie sieht aus wie eine Schlange. Sie braucht ein geräumiges Terrarium mit tiefem, grabbarem Bodengrund, einen warmen Platz und abwechslungsreiche Nahrung aus Insekten, Schnecken und Regenwürmern.

Familie: Anguidae

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**45-108 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**4-15 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber und in der Dämmerung**
Lebensweise	**Bodenbewohnend und grabend**
Lebensraum	**Savanne und Feuchtgebiet**
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**22-29 °C**
Sonnenplatz	**30-32 °C**
Temperatur, Nacht	**18-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**60-75 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 2
Winterruhe	**12-16 °C** 6-10 Wochen
Ernährung	**Insekten, Wirbeltiere und Würmer/Schnecken**
Haltung	**Einzeln**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**24 Monate**
Gelegegröße	**5-17 Eier**
Gelege pro Jahr	**1**
Inkubation	**50-65 Tage** bei 26-29 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Pflege von *Ophisaurus ventralis* ist nur wenig bekannt, und die Art wird selten gehalten.
TEMPERATUR	Die Tagestemperatur soll 22-29 °C betragen, mit einem Sonnenplatz von 30-32 °C, gemessen an der Oberfläche mit einem IR-Thermometer, und etwa 24 °C am kühlen Ende.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Luftfeuchtigkeit soll 60-75 % betragen. Die Art lebt auf feuchtem, sandigem Boden, daher muss ein Teil des Bodens leicht feucht sein, während der Rest abtrocknet, sodass das Tier wählen kann.
LICHT UND UVB	Die Art sonnt sich in der Natur und bevorzugt Halbschatten. Geboten wird eine UVB-Röhre in Ferguson-Zone 2 über dem Sonnenplatz, sodass das Tier selbst wählen kann, ins Licht zu gehen, und ein UV-Index von 2-3 am Sonnenplatz.
FÜTTERUNG	*Ophisaurus ventralis* ist ein opportunistischer Fleischfresser, der vor allem Insekten und andere Kleintiere nimmt, aber auch Schnecken, Regenwürmer, kleine Schlangen und Eier.
VERHALTEN UND UMGANG	*Ophisaurus ventralis* ist ruhig, mag es aber nicht, angefasst zu werden. Wird sie ergriffen, windet sie sich, kann beißen und wirft leicht den Schwanz ab, daher wird das Tier nie am Schwanz hochgehoben.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Vereinigte Staaten.