herpy

SCHWANZLURCHE

Tigersalamander

Ambystoma tigrinum

Ambystoma tigrinum ist ein kräftiger Querzahnmolch aus der östlichen Hälfte der USA, typischerweise 15-20 cm lang, mit gelben bis olivgrünen Flecken auf braunem bis schwarzem Grund. Die Larven leben im Wasser, die erwachsenen Tiere verbringen den größten Teil ihres Lebens in selbst gegrabenen Gängen und kommen nachts hervor. Manche Tiere verwandeln sich nie und werden mit erhaltenen Kiemen geschlechtsreif.

Familie: Ambystomatidae Englisch: Eastern Tiger Salamander **Schwaches Hautgift**

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**15-33 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**12-20 Jahre**
Aktiv	**Nachts**
Lebensweise	**Bodenbewohnend und grabend**
Lebensraum	**Gemäßigter Wald und Wiese**
Hautgift	**Schwach** Nach Kontakt die Hände waschen und die Finger von Augen und Mund fernhalten
Schwierigkeitsgrad	**Einsteiger**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**50 × 25 × 30 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**18-22 °C**
Temperatur, Nacht	**16-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**80-95 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Nicht nötig**
Ernährung	**Insekten, Wirbeltiere und Würmer/Schnecken**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Larven im Wasser**
Eiablage	**Im Wasser**
Geschlechtsreif	**5-48 Monate**
Eier pro Saison	**100-1.000**
Schlupf	**12-50 Tage**
Larvenzeit	**75-150 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Andere Larven und kleine Wassertiere (Daphnien, Mückenlarven)**
Brutpflege	**Keine**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Erwachsene Tiere können in vielen Arten von Behältern gehalten werden.
TEMPERATUR	*Ambystoma tigrinum* braucht tagsüber 18-22 °C, sowohl als Larve als auch als erwachsenes Tier, und nachts darf die Temperatur gern auf 16 °C sinken. Die Art verträgt Kälte besser als Wärme.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Der Bodengrund muss feucht, aber nie nass oder matschig sein, denn das Tier nimmt Wasser über die Haut auf. Die Luftfeuchtigkeit ist für die Art nicht dokumentiert; 80-95 % sind von *Ambystoma mavortium* übernommen.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Erwachsene Tiere brauchen keinen Wasserteil: Sie sind schlechte Schwimmer und können ertrinken.
LICHT UND UVB	*Ambystoma tigrinum* ist nachtaktiv und braucht kein besonderes Licht. Es ist nicht bekannt, dass die Art UVB benötigt, und starkes UV-Licht kann bei Amphibien Augen und Haut schädigen.
FÜTTERUNG	Larven und neotene Tiere fressen Regenwürmer, Kompostwürmer, passend große Grillen, Wachsmottenlarven und kleine Fische (keine Goldfische).
VERHALTEN UND UMGANG	Erwachsene Tiere graben und liegen den größten Teil des Tages versteckt. Sie sind nachtaktiv und jagen aus dem Hinterhalt. Viele Tiere lernen ihren Halter kennen und betteln um Futter.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Vereinigte Staaten.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/schwanzlurche/ambystoma-tigrinum