herpy

SCHWANZLURCHE

Ziegler's Crocodile Newt

Tylototriton ziegleri

Tylototriton ziegleri ist ein kleiner, fast ganz schwarzer Krokodilmolch von 13-16 cm mit drei Reihen großer Warzen entlang des Rückens und klar roten Fingern, Zehen und Schwanzunterseite. Die Art wurde 2013 beschrieben, lebt versteckt in Bergwäldern im Norden Vietnams und im Süden Chinas und ist in einem Terrarium mit kleinem Wasserteil leicht zu halten.

Familie: Salamandridae Früherer Name: *Yaotriton ziegleri* **Schwaches Hautgift**

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**13-16 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Gewicht	**6-16 g**
Lebenserwartung	**15-25 Jahre**
Aktiv	**In der Dämmerung und nachts**
Lebensweise	**Bodenbewohnend**
Lebensraum	**Bergwald**
Hautgift	**Schwach** Nach Kontakt die Hände waschen und die Finger von Augen und Mund fernhalten
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H für 3 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**22-24 °C**
Temperatur, Nacht	**20-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**80-100 %**
Wasser	**Wasserteil** Tiefe 1-5 cm
UVB	**Optional**
Winterruhe	**16-18 °C** 12-17 Wochen
Ernährung	**Insekten und Würmer/Schnecken**
Haltung	**Paarweise oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Larven im Wasser**
Eiablage	**Am Boden**
Eier pro Saison	**30-80**
Schlupf	**20-36 Tage** bei 20-24 °C
Larvenzeit	**50-110 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Andere Larven und kleine Wassertiere (Daphnien, Mückenlarven)**
Brutpflege	**Keine**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Gefährdet (VU)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	*Tylototriton ziegleri* wird in einem Regenwaldterrarium mit einem kleinen Wasserteil gehalten. Drei erwachsene Tiere brauchen ein Terrarium von mindestens 60 × 40 × 40 cm.
TEMPERATUR	Von März bis Oktober wird das Terrarium tagsüber bei 22-24 °C und nachts bei 20-22 °C gehalten.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80-100 %.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Der Wasserteil braucht weiches, schwach saures Wasser mit pH 6,4-6,8; z. B. Regenwasser, das eine Weile gestanden hat. Das Wasser ist höchstens 5 cm tief. Verwende niemals Leitungswasser, ohne das Chlor zu entfernen.
LICHT UND UVB	Das Licht hat für die Tiere keine besondere Bedeutung, sie mögen kein starkes Licht. Es richtet sich nach den Pflanzen: LED-Streifen oder Leuchtstoffröhren, 12 Stunden im Sommer und 10-11 Stunden im Winter.
FÜTTERUNG	Adulte Tiere bekommen für Salamander übliches Futter: Enchyträen, Grillen, Heimchen, Wachsmottenlarven, Regenwürmer und Asseln in passender Größe.
VERHALTEN UND UMGANG	Die Tiere sind versteckt und still und sind meist beim Füttern zu sehen oder dann, wenn die Männchen im Wasser sind.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Vietnam und China.