herpy

SCHILDKRÖTEN

Waldschildkröte

Chelonoidis denticulatus

Chelonoidis denticulatus ist eine große, dunkle Waldschildkröte aus dem Amazonasgebiet und den angrenzenden Wäldern mit gelben bis orangen Schuppen an Kopf und Beinen. Der Panzer ist typischerweise 35-45 cm lang, und in manchen Beständen werden die Tiere 60-70 cm groß. Die Art kann länger als 50 Jahre leben, braucht das ganze Jahr über gleichmäßige Wärme und hohe Luftfeuchtigkeit und frisst Blätter, Obst und etwas tierische Nahrung.

Familie: Testudinidae Englisch: Yellow-Footed Tortoise Früherer Name: *Chelonoidis denticulata; Geochelone denticulata; Testudo denticulata; Testudo tabulata* Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**35-70 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**50-60 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Bodenbewohnend**
Lebensraum	**Trockenwald und Regenwald**
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**320 × 160 × 60 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**26-29 °C**
Sonnenplatz	**29-32 °C**
Temperatur, Nacht	**20-23 °C**
Luftfeuchtigkeit	**70-90 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Notwendig** Ferguson-Zone 2
Ernährung	**Insekten, Obst, Pflanzen und Würmer/Schnecken**
Haltung	**Einzeln oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**96-120 Monate**
Gelegegröße	**2-7 Eier**
Inkubation	**120-190 Tage** bei 29-31 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Gefährdet (VU)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM

Chelonoidis denticulatus wird im Großen und Ganzen wie die nahe Verwandte *Chelonoidis carbonarius* gehalten, ist aber eine ausgeprägtere Waldart, die mehr Schatten, stabilere Wärme und eine gleichmäßig hohe Luftfeuchtigkeit braucht.

TEMPERATUR

Die Lufttemperatur beträgt tagsüber 26-29 °C, und der Sonnenplatz unter der Wärmelampe hat 29-32 °C, auf dem Untergrund selbst gemessen. Das kühlere Ende hat 24-26 °C.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER

Die Luftfeuchtigkeit ist für die Art nicht gemessen; 70-90 % sind von *C. carbonarius* übernommen und passen zu einer feuchten Waldart. Das Substrat muss gleichmäßig feucht sein, ohne im Wasser zu stehen.

LICHT UND UVB

C. denticulatus ist tagaktiv, aber eine schattenliebende Waldart, die sich nicht wie Wüstenarten in scharfem Licht sonnt. UVB ist trotzdem notwendig: Miss einen UV-Index von 2,0-3,0 am Sonnenplatz (Ferguson-Zone 2).

FÜTTERUNG

C. denticulatus ist Allesfresser. In der Natur frisst sie Blätter, Gras, Blüten, heruntergefallene Früchte, Pilze, Aas und langsame Kleintiere.

VERHALTEN UND UMGANG

Die Art ist ruhig und neugierig, aber oft etwas zurückhaltender als *C. carbonarius*, und sie hält sich am liebsten nahe an Deckung auf. Viele Tiere werden jedoch zutraulich und kommen hervor, wenn es Futter gibt.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET

Venezuela, Guyana, Suriname, Französisch-Guayana, Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Peru, Bolivien und Trinidad und Tobago.