herpy

SCHILDKRÖTEN

# *Kinixys belliana*

*Kinixys belliana* ist eine mittelgroße afrikanische Landschildkröte mit länglichem Panzer und einem beweglichen Scharnier hinten, mit dem sich der Panzer über Hinterbeinen und Schwanz schließen lässt. Der Panzer ist 15-22 cm lang. Die Art lebt in der Savanne mit deutlicher Regen- und Trockenzeit, braucht stabile Wärme und eine gewisse Feuchtigkeit und gerät leicht in Stress. Neu importierte Tiere tragen oft viele Parasiten.

Familie: Testudinidae  Englisch: Bell's Hinge-back Tortoise  Früherer Name: *Cinixys belliana; Kinixys schoensis*  Veröffentlicht am 16. November 2026

## STECKBRIEF

### DAS TIER

| | |
|---|---|
| Größe (adult) | **15-22 cm**<br>Gesamtlänge inkl. Schwanz |
| Lebenserwartung | **30-50 Jahre** |
| Aktiv | **Tagsüber** |
| Lebensweise | **Bodenbewohnend** |
| Lebensraum | **Savanne** |
| Schwierigkeitsgrad | **Erfahren** |

### HALTUNG

| | |
|---|---|
| Mindestgröße Terrarium | **160 × 80 × 40 cm**<br>L × B × H für 1 erwachsenes Tier |
| Temperatur, Tag | **28-32 °C** |
| Sonnenplatz | **32-35 °C** |
| Temperatur, Nacht | **22-24 °C** |
| Luftfeuchtigkeit | **60-80 %** |
| Wasser | **Wasserschale** |
| UVB | **Notwendig**<br>Ferguson-Zone 2 |
| Ernährung | **Insekten, Obst, Pflanzen und Würmer/Schnecken** |
| Haltung | **Einzeln oder in Gruppen** |

### ZUCHT

| | |
|---|---|
| Fortpflanzung | **Eierlegend** |
| Gelegegröße | **1-6 Eier** |
| Gelege pro Jahr | **1-2** |
| Inkubation | **105-200 Tage**<br>bei 28-31 °C |

### SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

| | |
|---|---|
| CITES | **Anhang II** |
| EU-Anhang | **Anhang B** |
| IUCN | **Nicht beurteilt (NE)** |

## Haltung auf einen Blick

**DAS TERRARIUM**

Es gibt nur wenig gesichertes Wissen über die Haltung von *Kinixys belliana*, weil ein großer Teil des älteren Wissens aus der Zeit stammt, als mehrere Arten als eine galten.

**TEMPERATUR**

Das Tier muss warm gehalten werden, die meiste Zeit über 29 °C. Die Tagestemperatur beträgt 28-32 °C, und der Sonnenplatz hat 32-35 °C, am Untergrund gemessen.

**LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER**

Als Savannenart ist *K. belliana* weniger feuchtigkeitsbedürftig als die Waldarten *Kinixys homeana* und *Kinixys erosa*, mag aber Feuchtigkeit und muss regelmäßig besprüht werden.

**LICHT UND UVB**

*K. belliana* ist tagaktiv, aber am aktivsten früh und spät am Tag, wenn das Licht schwach ist. Sonnenlicht ist das Beste, doch in Dänemark ist UVB-Licht nötig: UV-Index 2,0-3,0 am Sonnenplatz (Ferguson-Zone 2).

**FÜTTERUNG**

*K. belliana* ist ein Allesfresser, und Jungtiere sind fast ausschließlich Fleischfresser.

**VERHALTEN UND UMGANG**

Die Art ist scheu und zieht sich in den Panzer zurück oder gräbt sich ein, wenn sie gestört wird. Sie ist am aktivsten früh am Morgen und spät am Tag.

**NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET**

Angola, Burundi, Zentralafrikanische Republik, Kongo-Kinshasa, Eritrea, Äthiopien, Kenia, Ruanda, Somalia, Südsudan, Sudan, Uganda, Tansania und Malawi.