herpy

SCHILDKRÖTEN

Spanische Wasserschildkröte

Mauremys leprosa

Mauremys leprosa ist eine tagaktive, halbaquatische Schildkröte von der Iberischen Halbinsel, aus Südfrankreich und Nordwestafrika. Der Panzer wird typischerweise 12-18 cm lang, und Jungtiere haben oft klare gelbe und rote Zeichnungen. Die Art verträgt viele Wasserarten und braucht ein großes, gefiltertes Aquarium oder einen geschlossenen Gartenteich mit Sonnenplatz und UVB.

Familie: Geoemydidae Englisch: Spanish Terrapin Früherer Name: *Emys leprosa; Clemmys leprosa* Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**12-21 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**20-30 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Semiaquatisch**
Lebensraum	**Feuchtgebiet**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**150 × 60 × 60 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**22-28 °C**
Sonnenplatz	**30-35 °C**
Temperatur, Nacht	**15-20 °C**
Luftfeuchtigkeit	**50-80 %**
Wasser	**Aquaterrarium** Tiefe 30-35 cm
Wassertemperatur	**20-26 °C**
UVB	**Notwendig** Ferguson-Zone 3
Ernährung	**Insekten, Fertigfutter, Pflanzen, Wirbeltiere und Würmer/Schnecken**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**3-16 Eier**
Inkubation	**65-75 Tage** bei 27-30 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht beurteilt (NE)**

Über die Art

Mauremys leprosa ist eine kleine bis mittelgroße Süßwasserschildkröte. Der Panzer (Carapax) ist oval und flach, bei Jungtieren oft mit roten bis orangen Zeichnungen, während ältere Tiere einheitlich grünbraun werden. Hals und Kopf haben feine gelbe Streifen. Alle Maße im Text beziehen sich auf die Panzerlänge. Die meisten erwachsenen Tiere sind 12-18 cm groß, und große Weibchen können etwa 21 cm erreichen. In vielen Wildbeständen ist der Großteil der Tiere kleiner als 12 cm.

Der Artname *leprosa* ist lateinisch für "aussätzig" und spielt vermutlich auf den abgenutzten, fleckigen Panzer an, den viele ältere Tiere haben.

Man unterscheidet zwei Unterarten: *M. l. leprosa* von der Iberischen Halbinsel und aus dem nordwestlichen Afrika und *M. l. saharica* aus den südlichen und östlichen Teilen Marokkos, Algeriens, Tunesiens und Libyens. Die Art gibt ein übelriechendes Sekret ab, wenn sie hochgenommen wird.

Die Art ist ruhig, wasserliebend und tagaktiv, und sie sonnt sich oft. In Gefangenschaft ist sie nicht wählerisch, braucht aber eine große Anlage und einen Filter, der ihre Ausscheidungen bewältigt. Die Lebenserwartung ist nicht näher dokumentiert; 20-30 Jahre sind von verwandten *Mauremys*-Arten übernommen.

Verbreitung und Lebensraum

Mauremys leprosa lebt im westlichen Mittelmeerraum: im Süden und Osten Spaniens und Portugals, in Südfrankreich und Nordwestafrika von Marokko, Algerien und Tunesien bis zum westlichen Libyen. *M. l. saharica* kommt am weitesten im Süden und Osten vor. Die Art ist in der südlichen Hälfte der Iberischen Halbinsel am zahlreichsten. Es gibt auch Funde aus Westsahara und Mauretanien, und die Art wird aus mehreren Ländern weiter südlich in Westafrika angegeben, u. a. Niger, Gambia, Benin und möglicherweise Senegal.

Die Art ist auf Mallorca eingeführt. Die Karte zeigt nur die ursprüngliche Verbreitung.

> **Natürliches Verbreitungsgebiet:** Spanien, Portugal, Frankreich, Marokko, Algerien, Tunesien, Libyen, Mauretanien und Westsahara.

LEBENSRAUM

M. leprosa kommt in vielen Gewässertypen vor: schnell fließenden Gebirgsbächen, tiefen Felslöchern an Bächen, Teichen, Seen, Kanälen, Bewässerungsgräben und brackigen Küstenlagunen. Die Art verträgt saures, alkalisches und salzhaltiges Wasser und sogar starke Verschmutzung, und sie ist weniger wählerisch als viele andere Wasserschildkröten.

Im Frühjahr liegt die Wassertemperatur in südspanischen Gebirgsbächen bei 12-16 °C, und das Wasser ist stark alkalisch (pH etwa 8). Die Tiere sonnen sich ab etwa 10 Uhr auf großen Steinen und tauchen bei der geringsten Störung in dichten Wasserpflanzenbewuchs ab. In Nordafrika trocknen im Sommer viele Teiche aus, und die Tiere halten dann in den heißesten Monaten, in denen die Temperatur 47 °C erreichen kann, Sommerruhe. In den nördlichen Gegenden hält die Art Winterruhe, während Tiere im südlichen Marokko den ganzen Winter über aktiv sind.

Die Nahrung besteht aus Fadenalgen, Wasserpflanzen und Insektenlarven, Regenwürmern, Schnecken, Kaulquappen und kleinen Amphibien, und die Art nimmt gern Aas.

Mehr lesen: Aufzucht von Kaulquappen Mehr lesen: Winterruhe und Jahreszeiten

Haltung

DAS TERRARIUM

Halte das Tier in einem Aquarium, einem großen Becken oder einem geschlossenen Gartenteich, nicht in einem gewöhnlichen Terrarium. Die Wassermenge bestimmt die Größe: Rechne mit mindestens 15 Litern Wasser pro cm Panzerlänge für das erste Tier und 7,5 Litern für jedes weitere, und die Wassertiefe muss mindestens das 1,5-Fache der Panzerlänge betragen. Eine erwachsene Schildkröte von 18 cm braucht also mindestens 270 Liter und mindestens 27 cm Wasser. Die Maße der Spezifikationsbox, 150 × 60 × 60 cm, ergeben einen Wasserteil von 110 × 60 cm mit 35 cm Wasser (gut 230 Liter) und einen Landteil von 40 × 60 cm. Das ist ein Minimum, und eine größere Anlage ist immer besser.

Der Landteil muss groß genug sein, dass das ganze Tier vollständig aus dem Wasser kommt und ganz abtrocknet. Baue ihn als Strand oder Ablage mit einer rauen Rampe und einem großen, flachen Stein als Sonnenplatz. Lampe und UVB sitzen direkt über dem Sonnenplatz. Der Rand um den Landteil muss mindestens 25 cm hoch sein. Ein Weibchen braucht eine Kiste mit Erde oder Sand als Eiablageplatz.

Die Art ist an dichten Wasserpflanzenbewuchs gewöhnt und taucht ab, um sich zu verstecken, daher biete Verstecke unter Wasser aus Wurzeln oder Steinen, die sich nicht verschieben oder das Tier einklemmen können, und lass gern Pflanzen im Becken wachsen. Steine und Treibholz müssen stabil liegen. Wasser ist schwer: 270 Liter wiegen 270 kg, stelle die Anlage also auf einen Boden, der sie tragen kann.

Ein Gartenteich ist im Sommer gut geeignet. Der Teich muss völlig ausbruchsicher sein: ein Zaun, der mindestens 30 cm tief in den Boden reicht, und ein Netz über der Oberseite gegen Fressfeinde. Die Art verträgt eine große Temperaturspanne, muss aber hereingeholt werden, wenn das Wasser im Herbst kalt wird.

Halte am besten ein Tier. Mehrere Männchen können untereinander aggressiv sein, und Weibchen können bei der Paarung in Gesicht und Hals gebissen werden.

Mehr lesen: Licht und UVB Mehr lesen: Wärme und Temperatur

TEMPERATUR

Die Oberfläche des Sonnenplatzes soll 30-35 °C haben, gemessen mit einem Infrarotthermometer ein paar Stunden nach dem Einschalten der Lampen, und die Raumluft tagsüber 22-28 °C. Die Wärmelampe muss im selben Abstand zum Sonnenplatz sitzen wie die UVB-Röhre. Die Temperatur des Sonnenplatzes ist von verwandten *Mauremys*-Arten übernommen.

Die Wassertemperatur ist für die Gefangenschaft nicht dokumentiert; 20-26 °C passen zu einem Mittelmeerklima. Eine Anlage, die das ganze Jahr über in einem Raum oder draußen gehalten wird, soll im Winter nicht unter 18 °C kommen, und im Sommer sollte das Wasser nicht wärmer als etwa 26 °C werden. Stelle den Wasserheizer auf eine niedrige Temperatur ein, sodass ein Gefälle zwischen dem kühlen Wasser und dem warmen Sonnenplatz entsteht, und verwende einen Heizer mit Kunststoffschutz und automatischer Abschaltung.

Nachts werden die Lampen ausgeschaltet, und 15-20 °C passen. In der Natur hält die Art in den nördlichen Gegenden Winterruhe, während Tiere im südlichen Marokko den ganzen Winter über aktiv sind. Temperatur und Dauer einer Winterruhe in Gefangenschaft sind nicht dokumentiert, daher sollte eine Winterruhe nicht erzwungen werden. Wird das Tier den ganzen Winter über oberhalb von 18 °C gehalten, frisst es weiter und bleibt aktiv.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER

Die Feuchtigkeit der Schildkröte ist das Wasser selbst, daher ist die relative Luftfeuchtigkeit für die Art nicht näher dokumentiert; 50-80 % im Raum sind reichlich. Entscheidend sind die Sauberkeit des Wassers und ein Landteil, auf dem das Tier ganz abtrocknen kann.

Das Tier setzt seinen Kot im Wasser ab, daher wird das Wasser schnell schmutzig. Verwende einen kräftigen Filter, wechsle regelmäßig einen Teil des Wassers und entferne Futterreste nach dem Füttern mit einem Netz. Die Art verträgt schlechtes Wasser besser als viele andere Schildkröten, aber das macht es nicht gesund: Schlechtes Wasser führt zu Panzer- und Hautentzündungen.

Mehr lesen: Luftfeuchtigkeit, Besprühen und Belüftung

WASSER UND WASSERQUALITÄT

Das Wasser ist der Aufenthaltsort des Tieres, daher muss es tief und sauber sein. Die Wassertiefe muss mindestens das 1,5-Fache der Panzerlänge betragen, und 30-35 cm passen für erwachsene Tiere. Die Temperatur beträgt 20-26 °C (siehe Temperatur).

Die Art verträgt sowohl saures, alkalisches als auch leicht salzhaltiges Wasser, aber die Toleranzgrenze ist kein Ziel: In Gefangenschaft muss das Wasser sauber sein, ohne messbares Ammoniak. Wähle einen externen Tonnenfilter, der für mindestens das 2-3-Fache der Wassermenge ausgelegt ist und sowohl mechanisch als auch biologisch filtert. Ein UV-C-Klärer kann das Algenwachstum niedrig halten und die Menge an Mikroben im Wasser verringern. Spüle das Filtermedium in Wasser aus dem Becken, nicht aus dem Hahn, damit die Bakterien erhalten bleiben, und verwende nie Seife oder Chemikalien. Schließe alle elektrischen Geräte am Wasser an einen Fehlerstromschutzschalter (FI) an.

LICHT UND UVB

UVB ist eine Notwendigkeit. Verwende eine T5-HO-Röhre mit Reflektor über dem Sonnenplatz, sodass das Tier UVB bekommt, wenn es sich trocknet. Ferguson-Zone 3 und ein UV-Index von 3,0-4,0 auf dem Sonnenplatz sind von entsprechenden sonnenliebenden Wasserschildkröten übernommen. An anderen Stellen der Anlage muss der UV-Index niedriger sein, damit das Tier wählen kann. Befolge die Empfehlung des Röhrenherstellers für den Abstand zum Rücken des Tieres.

Kunststoff und Glas stoppen UVB vollständig, und dichtes Netz stoppt einen großen Teil, daher darf sich nichts zwischen Röhre und Tier befinden. UVB-Röhren verlieren an Stärke und müssen regelmäßig gewechselt werden. UVB liefert dem Tier Vitamin D3, das die Schildkröte braucht, um Kalk aufzunehmen.

Das Licht muss 11-13 Stunden am Tag brennen. Verwende nachts kein farbiges Licht.

Mehr lesen: Kalk, Vitamine und Ergänzungen

FÜTTERUNG

M. leprosa frisst in der Natur eine Mischung aus Pflanzen und Tieren: Fadenalgen, Wasserpflanzen, Insektenlarven, Regenwürmer, Schnecken, Kaulquappen und kleine Amphibien, und sie nimmt gern Aas. Die Schildkröte frisst im Wasser, also wirf das Futter ins Becken.

In Gefangenschaft kann die Kost aus Fertigfutter für Wasserschildkröten, Schnecken, Würmern, Garnelen, Fisch und Grünfutter bestehen. Füttere höchstens an drei Tagen pro Woche: Häufigeres Füttern führt zu zu schnellem Wachstum und belastet das Wasser. Mindestens eine Mahlzeit pro Woche kann getrocknetes Futter sein, das in Wasser mit Kalk und Vitaminen eingeweicht wurde. Das Futter saugt das Präparat auf, sodass es nicht im Wasser abgespült wird. Grünfutter: Löwenzahn, Klee, Vogelmiere, Kopfsalat und Wasserlinsen können im Becken schwimmen. Jungtiere brauchen mehr tierische Nahrung als erwachsene Tiere, und die Tiere ernähren sich anfangs von Insektenlarven.

Wasche Pflanzen aus der Natur und verwende nur solche, die nicht gespritzt und sicher bestimmt sind.

VERHALTEN UND UMGANG

M. leprosa ist tagaktiv und in der Natur scheu: Sie taucht bei der geringsten Störung ab, aber die Neugier lässt sie oft nach einem Augenblick den Kopf wieder herausstrecken. Die meisten Tiere mögen es nicht, berührt zu werden. Beim Handling gibt die Art ein übelriechendes Sekret ab. Füttere mit einer Pinzette, nicht mit den Fingern, denn die Art hat einen scharfen Schnabel.

Muss das Tier hochgehoben werden, greife es von unten mit der Handfläche und halte den Panzer mit beiden Händen. Wasche die Hände vorher und nachher und lass Kinder unter 5 Jahren das Tier nicht anfassen.

Das Tier gedeiht gut allein. Die Männchen können untereinander aggressiv sein, und Weibchen können in der Paarungszeit schwere Bisse in Gesicht und Hals bekommen, daher werden Paare nur in einer großen Anlage mit Verstecken und unter Aufsicht gehalten. Halte die Art nicht zusammen mit anderen Arten der Gattung, weil *Mauremys*-Arten bereitwillig hybridisieren.

Zucht

GESCHLECHTSREIFE UND GESCHLECHTSBESTIMMUNG

Geschlechtsunterschiede und Alter oder Größe bei der Geschlechtsreife sind für die Art nicht näher dokumentiert. Allgemein haben Männchen der Gattung einen längeren und dickeren Schwanz und einen leicht nach innen gewölbten Bauchpanzer, und das Weibchen wird größer. Bei verwandten *Mauremys*-Arten folgt die Geschlechtsreife der Größe, nicht dem Alter.

PAARUNG

Die Paarung findet normalerweise unter Wasser statt, kann aber auch an Land erfolgen. Das Weibchen kann schwere Bisse in Gesicht und Hals bekommen, daher muss es unter Aufsicht gehalten werden und Platz zum Ausweichen haben. Die Saison und eventuelle Anforderungen an eine kühlere Phase sind für die Gefangenschaft nicht näher dokumentiert.

EIABLAGE UND GELEGE

Ein Weibchen legt typischerweise 5-10 Eier pro Gelege, etwas mehr als die nah verwandte *Mauremys caspica*, und große Weibchen können bis zu 16 legen. Die Eier messen ungefähr 36 × 22 mm, und große Weibchen legen größere Eier. Die Anzahl der Gelege pro Jahr und der Abstand sind nicht dokumentiert. Biete dem Weibchen im Landteil eine Kiste mit Erde oder Sand an, auch wenn es allein gehalten wird, damit es einen Platz zum Graben hat.

INKUBATION

Die Eier werden bei 27-30 °C und 75-90 % Luftfeuchtigkeit in einem Substrat mit mittlerer bis hoher Feuchtigkeit erbrütet. Bei diesen Temperaturen schlüpfen sie nach 65-75 Tagen. Ob das Geschlecht von der Temperatur abhängt, ist für die Art nicht dokumentiert.

AUFZUCHT DER JUNGTIERE

Die Jungtiere sind anfangs fleischfressend und fressen vor allem Insektenlarven. Gib ihnen Wasser mit Versteck, einen Sonnenplatz und tierische Nahrung und gehe allmählich zu Fertigfutter und Grünfutter über. Jungtiere brauchen einen Sonnenplatz, auf den sie leicht hinaufkommen. Werden mehrere Jungtiere zusammen gehalten, müssen sie gleich groß sein, und alle müssen Futter bekommen.

Gesundheit und typische Fehler

Schildkröten verbergen Krankheiten, achte daher auf Veränderungen. Wiege und miss das Tier einmal im Monat und führe ein Logbuch über Gewicht, Appetit und Verhalten. Ein plötzlicher Gewichtsverlust ist oft das erste Anzeichen einer Krankheit.

Typische Probleme und Fehler bei der Pflege: - Schlechte Wasserqualität: führt zu Panzer-, Haut- und Ohrentzündungen. - Panzerfäule, wenn das Tier nicht ganz aus dem Wasser kommen und abtrocknen kann. - Mangel an UVB oder Kalk: führt zu Knochenerkrankung mit weichem, missgebildetem Panzer und Schlaffheit. - Überfütterung: führt zu zu schnellem Wachstum und belastet das Wasser. - Parasiten: Lass bei einem neuen Tier eine Kotprobe beim Tierarzt untersuchen.

Alle Reptilien können symptomfreie Träger von Salmonellen sein und Menschen anstecken. Wasche die Hände vor und nach dem Kontakt mit dem Tier, dem Wasser und der Ausrüstung und lass Kinder unter 5 Jahren das Tier nicht anfassen. Nach einem Biss muss die Wunde etwa fünf Minuten unter fließendem Wasser gespült und mit milder Seife gereinigt werden; suche bei tiefen, blutenden oder entzündeten Wunden einen Arzt auf.

Suche einen Tierarzt mit Erfahrung bei Reptilien auf, wenn das Tier abnimmt, nicht frisst, mit offenem Maul atmet oder träge wirkt.

Mehr lesen: Quarantäne und Hygiene

Frag immer erfahrene Bekannte

Diese Anleitung ist ein guter Ausgangspunkt, aber sie ersetzt keine Erfahrung. Tiere sind verschieden, und vieles von dem Wichtigsten lernt man von denen, die die Art seit Jahren halten. Sprich mit einem Züchter, einem erfahrenen Halter oder einem Tierarzt, der sich mit Reptilien und Amphibien auskennt, bevor du dir das Tier anschaffst - und noch einmal, wenn dir etwas merkwürdig vorkommt.