herpy

SCHILDKRÖTEN

## Breitrandschildkröte

# *Testudo marginata*

*Testudo marginata* ist Europas größte Landschildkröte, eine schwarz-gelbe Gebirgsbewohnerin aus Griechenland mit einem länglichen Panzer, der hinten glockenförmig ausgestellt ist. Der Panzer wird 25-40 cm lang, das Tier kann über 50 Jahre alt werden, und es gehört im Sommerhalbjahr nach draußen, ernährt sich von Wildkräutern und Gräsern und hält Winterruhe.

Familie: Testudinidae  Englisch: Marginated Tortoise  Veröffentlicht am 16. November 2026

**STECKBRIEF**

### DAS TIER

| | |
|---|---|
| Größe (adult) | **25-40 cm**<br>Gesamtlänge inkl. Schwanz |
| Lebenserwartung | **50-70 Jahre** |
| Aktiv | **Tagsüber** |
| Lebensweise | **Bodenbewohnend** |
| Lebensraum | **Halbwüste, Felsgelände und gemäßigter Wald und Wiese** |
| Schwierigkeitsgrad | **Fortgeschritten** |

### HALTUNG

| | |
|---|---|
| Mindestgröße Terrarium | **240 × 120 × 40 cm**<br>L × B × H für 1 erwachsenes Tier |
| Temperatur, Tag | **22-29 °C** |
| Sonnenplatz | **35-38 °C** |
| Temperatur, Nacht | **15-20 °C** |
| Luftfeuchtigkeit | **50-70 %** |
| Wasser | **Wasserschale** |
| UVB | **Notwendig**<br>Ferguson-Zone 3 |
| Winterruhe | **4-6 °C**<br>8-16 Wochen |
| Ernährung | **Pflanzen** |
| Haltung | **Einzeln oder paarweise** |

### ZUCHT

| | |
|---|---|
| Fortpflanzung | **Eierlegend** |
| Gelegegröße | **3-15 Eier** |
| Gelege pro Jahr | **1-3** |
| Inkubation | **55-85 Tage**<br>bei 28-32 °C |

### SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

| | |
|---|---|
| CITES | **Anhang II** |
| EU-Anhang | **Anhang A** |
| IUCN | **Nicht gefährdet (LC)** |

## Haltung auf einen Blick

| | |
|---|---|
| **DAS TERRARIUM** | *Testudo marginata* ist kein Tier für ein geschlossenes Terrarium. |
| **TEMPERATUR** | Draußen muss *Testudo marginata* sich auf mindestens 30 °C aufwärmen und Schatten aufsuchen können, wenn es zu heiß wird. Drinnen sollten es im Raum tagsüber 22-29 °C sein und am Sonnenplatz unter dem Wärmestrahler 35-38 °C. |
| **LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER** | Die Art stammt aus einer trockenen Landschaft, braucht aber mäßige Feuchtigkeit, besonders im Wachstum. |
| **LICHT UND UVB** | *T. marginata* ist tagaktiv und braucht UVB, um Vitamin D3 zu bilden, wenn sie nicht in direktem Sonnenlicht ist. Am besten ist ungefiltertes Sonnenlicht, das im Sommerhalbjahr das ganze UVB liefert, das das Tier braucht. |
| **FÜTTERUNG** | *T. marginata* ist Pflanzenfresser, und die Kost muss ballaststoffreich, eiweißarm, zuckerarm und kalziumreich sein. |
| **VERHALTEN UND UMGANG** | Die Art ist ruhig und ausgeglichen, aber kein Haustier, das man hochnehmen sollte. Das Tier lernt seinen Halter kennen und kommt gern, wenn es Futter gibt. Fasse es nur an, wenn es nötig ist, und stütze immer unter dem Bauchpanzer. |
| **NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET** | Griechenland und Albanien. |