herpy

SKINKE

Pink-Tongued Lizard

Cyclodomorphus gerrardii

Cyclodomorphus gerrardii ist ein schlanker, ruhiger Skink aus dem Osten Australiens mit rosa Zunge, dunklen Querbändern und einem langen, leicht greifenden Schwanz. Die Art wird 40-45 cm lang, lebt in feuchtem Wald, ist vor allem in der Dämmerung und nachts aktiv und ernährt sich in der Natur fast nur von Schnecken. Sie bringt lebende Junge zur Welt, oft viele pro Wurf, und erwachsene Tiere sind sehr umgänglich.

Familie: Scincidae Früherer Name: *Hemisphaeriodon gerrardii; Tiliqua gerrardii; Hinulia gerrardii*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**40-45 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**15-20 Jahre**
Aktiv	**In der Dämmerung und nachts**
Lebensweise	**Baumbewohnend und bodenbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald und gemäßigter Wald und Wiese**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**20-30 °C**
Sonnenplatz	**33-36 °C**
Temperatur, Nacht	**18-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**60-80 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 2
Winterruhe	**16-22 °C** 8-12 Wochen
Ernährung	**Insekten, Obst, Fertigfutter, Wirbeltiere und Würmer/Schnecken**
Haltung	**Einzeln**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Lebendgebärend**
Geschlechtsreif	**22-36 Monate**
Wurfgröße	**10-30 Jungtiere**
Tragzeit	**90-120 Tage**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein erwachsenes Tier braucht ein Terrarium von mindestens 120 × 60 × 60 cm (Länge × Breite × Höhe).
TEMPERATUR	Die Lufttemperatur soll tagsüber 25-30 °C betragen, mit einem kühlen Ende von 20-25 °C. Die Oberfläche des Sonnenplatzes soll 33-36 °C haben.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Art stammt aus feuchtem Wald, und eine Luftfeuchtigkeit von 60-80 % ist passend. Das Terrarium muss gut belüftet sein. Halte den Bodengrund leicht feucht, aber nie nass, und sprühe das Terrarium einmal täglich leicht ein.
LICHT UND UVB	Das Tier ist in der Dämmerung und nachts am aktivsten und lebt am Waldboden, profitiert aber von schwachem UVB.
FÜTTERUNG	In der Natur ernährt sich *Cyclodomorphus gerrardii* fast ausschließlich von Schnecken und Nacktschnecken, und die großen, flachen Zähne hinten im Maul dienen dazu, Schneckenhäuser zu knacken.
VERHALTEN UND UMGANG	Erwachsene Tiere gehören zu den ruhigsten und umgänglichsten Skinken. Sie bewegen sich langsam und lassen sich leicht aufnehmen.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Australien.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/skinke/cyclodomorphus-gerrardii