herpy

SKINKE

Cunningham's Skink

Egernia cunninghami

Ein großer, tagaktiver und sehr sozialer Skink mit Stachelschwanz aus dem gemäßigten Südosten Australiens. *Egernia cunninghami* lebt in Familiengruppen in Felsspalten, bringt lebende Junge zur Welt und hält in den kalten Monaten Winterruhe. Er braucht ein großes, sonniges Terrarium mit soliden Felsstrukturen und UVB.

Familie: Scincidae Früherer Name: *Tiliqua cunninghami*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**30-40 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Gewicht	**200-350 g**
Lebenserwartung	**20-27 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Felsbewohnend**
Lebensraum	**Felsgelände und gemäßigter Wald und Wiese**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**24-30 °C**
Sonnenplatz	**35-40 °C**
Temperatur, Nacht	**12-18 °C**
Luftfeuchtigkeit	**40-60 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Notwendig** Ferguson-Zone 3
Ernährung	**Insekten, Obst, Pflanzen und Würmer/Schnecken**
Haltung	**Paarweise oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Lebendgebärend**
Geschlechtsreif	**60 Monate**
Wurfgröße	**1-8 Jungtiere**
Gelege pro Jahr	**1**
Tragzeit	**90 Tage**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang III**
EU-Anhang	**Anhang C**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM

Egernia cunninghami ist eine große Art und braucht ein geräumiges Terrarium. Ein Paar braucht mindestens 120 × 60 × 60 cm (Länge × Breite × Höhe). Eine kleine Gruppe aus einem Männchen und drei bis vier Weibchen braucht mehr.

TEMPERATUR

Am Tag soll die Luft 24-30 °C haben, mit einem deutlichen Gefälle vom kühlen zum warmen Ende.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER

Egernia cunninghami stammt aus gemäßigten Felswäldern, und eine Luftfeuchtigkeit von 40-60 % passt.

LICHT UND UVB

Egernia cunninghami ist tagaktiv, sonnt sich viel und braucht UVB, solange das Licht an ist.

FÜTTERUNG

Egernia cunninghami ist ein Allesfresser, aber erwachsene Tiere sind überwiegend Pflanzenfresser: In der Natur besteht über 90 % ihrer Nahrung aus Pflanzenteilen. Jungtiere fressen weit mehr Gliedertiere.

VERHALTEN UND UMGANG

Egernia cunninghami ist eines der sozialsten Reptilien: Sie lebt in langlebigen Familiengruppen.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET

Australien.