herpy

SKINKE

Blotched Blue-Tongued Lizard

Tiliqua nigrolutea

Tiliqua nigrolutea ist ein kräftiger, schwer gebauter Skink aus dem Südosten Australiens mit breiter blauer Zunge und hellen, unregelmäßigen Flecken auf dunklem Rücken. Sie ist tagaktiv und Allesfresser, wird 35-50 cm lang und kann viele Jahre alt werden. Die Art stammt aus einem kühlen, gemäßigten Klima mit deutlicher Winterruhe und braucht ein großes Terrarium, UVB und eine Nachtabsenkung.

Familie: Scincidae Früherer Name: *Scincus nigroluteus; Cyclodus nigroluteus*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**35-55 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**15-30 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Bodenbewohnend**
Lebensraum	**Bergwald und gemäßigter Wald und Wiese**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**180 × 60 × 60 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**21-29 °C**
Sonnenplatz	**37-40 °C**
Temperatur, Nacht	**18-24 °C**
Luftfeuchtigkeit	**40-50 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 3
Ernährung	**Insekten, Obst, Pflanzen und Würmer/Schnecken**
Haltung	**Einzeln**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Lebendgebärend**
Wurfgröße	**5-11 Jungtiere**
Tragzeit	**90-150 Tage**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang III**
EU-Anhang	**Anhang C**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein adultes Tier braucht ein Terrarium von mindestens 180 × 60 × 60 cm (Länge × Breite × Höhe), das entspricht gut 1 m² Grundfläche. Größer ist besser.
TEMPERATUR	Die Lufttemperatur muss vom kühlen bis zum warmen Ende bei 21-29 °C liegen, und die Oberfläche des Sonnenplatzes muss 37-40 °C haben, damit das Tier den Körper bei den 30-35 °C halten kann, die es im aktiven Zustand bevorzugt.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Luftfeuchtigkeit muss 40-50 % betragen, gemessen am kühlen Ende. Ein nasser Bodengrund ist nicht nötig, aber ein Versteck mit feuchtem Sphagnum, in dem die Feuchtigkeit gegen 100 % geht, hilft bei der Häutung.
LICHT UND UVB	Die Art ist tagaktiv und braucht sowohl UVB als auch kräftiges Licht. Verwende eine T5-Röhre mit UVB, und platziere sie so, dass der UV-Index am Sonnenplatz etwa 3-4 beträgt (Ferguson-Zone 3).
FÜTTERUNG	*Tiliqua nigrolutea* ist Allesfresser. Das Grundfutter ist eine Mischung aus Grünzeug, tierischem Eiweiß und etwas Obst. Jungtiere unter 12 Monaten brauchen 70-80 % Eiweiß, adulte Tiere etwa 50-60 %.
VERHALTEN UND UMGANG	*Tiliqua nigrolutea* ist ruhig, und Nachzuchten werden oft zahm. Wenn du das Tier hochhebst, muss der ganze Körper einschließlich des Schwanzes auf dem Unterarm ruhen, und eine Hand muss sichtbar sein.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Australien.