herpy

SKINKE

Western Blue-Tongued Lizard

Tiliqua occipitalis

Tiliqua occipitalis ist ein kräftiger, bodenlebender Skink aus dem Süden und der Mitte Australiens mit braunen Querbändern über Körper und Schwanz und der breiten, blauen Zunge, die die Gattung kennzeichnet. Die Art wird etwa 40 cm lang, ist tagaktiv und Allesfresser und braucht ein großes Terrarium mit UVB und einem warmen Sonnenplatz. Sie bringt lebende Jungtiere zur Welt und wird selten in menschlicher Obhut gehalten.

Familie: Scincidae Früherer Name: *Cyclodus occipitalis; Cyclodus fasciatus*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**35-45 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**15-20 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Bodenbewohnend**
Lebensraum	**Halbwüste und gemäßigter Wald und Wiese**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**22-32 °C**
Sonnenplatz	**35-45 °C**
Temperatur, Nacht	**15-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**30-50 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 3
Ernährung	**Insekten, Obst, Pflanzen, Wirbeltiere und Würmer/Schnecken**
Haltung	**Einzeln**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Lebendgebärend**
Wurfgröße	**5 Jungtiere**
Gelege pro Jahr	**1**
Tragzeit	**90-120 Tage**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang III**
EU-Anhang	**Anhang C**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM
Ein adultes Tier braucht ein Terrarium von mindestens 120 × 60 × 60 cm (Länge × Breite × Höhe). Größer ist besser. Die Bodenfläche ist wichtiger als die Höhe, weil das Tier am Boden lebt. Der Skink wird am besten allein gehalten.

TEMPERATUR
Biete dem Tier ein Temperaturgefälle von 22-26 °C am kühlen Ende bis 28-32 °C am warmen Ende. Die Oberfläche des Sonnenplatzes muss 35-45 °C haben, und das Tier muss wählen können, wie warm es liegen will.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER
Die Art stammt aus trockenen bis halbtrockenen Gegenden und braucht keine hohe Luftfeuchtigkeit. 30-50 % sind angemessen, gemessen am kühlen Ende. Der Bodengrund muss weiter unten leicht feucht sein, aber niemals nass.

LICHT UND UVB
Die Art ist tagaktiv und braucht sowohl UVB als auch kräftiges Licht. Verwende eine T5-Röhre mit UVB über dem Gitter, und platziere sie so, dass der UV-Index am Sonnenplatz 3-4 beträgt (Ferguson-Zone 3).

FÜTTERUNG
Tiliqua occipitalis ist Allesfresser, und das Futter sollte so abwechslungsreich wie möglich sein. Grünzeug sind z. B.

VERHALTEN UND UMGANG
Der Skink ist die ersten Tage scheu, gewöhnt sich aber ein und verträgt ruhiges Handling.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET
Australien.