herpy

SKINKE

African Five-lined Skink

Trachylepis quinquetaeniata

Trachylepis quinquetaeniata ist ein aktiver, tagaktiver Skink aus dem nördlichen und zentralen Afrika mit glänzenden, metallisch schimmernden Schuppen, hellen Längsstreifen und einem Schwanz, der bei Jungtieren und Weibchen elektrisch blau leuchtet. Er sonnt sich auf Steinen und ernährt sich von Insekten. Er ist schnell und scheu und eignet sich daher am besten als Schautier, nicht zum Handling.

Familie: Scincidae

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**20-25 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**4-5 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Felsbewohnend und bodenbewohnend**
Lebensraum	**Halbwüste, Savanne und Felsgelände**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**90 × 45 × 45 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**24-29 °C**
Sonnenplatz	**32-35 °C**
Temperatur, Nacht	**20-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**60-80 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Notwendig** Ferguson-Zone 3
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Einzeln oder ein Männchen mit mehreren Weibchen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**12-15 Monate**
Gelegegröße	**3-10 Eier**
Gelege pro Jahr	**1-2**
Inkubation	**60-62 Tage** bei 27-29 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM

Ein einzelnes Tier braucht ein Terrarium von mindestens 90 × 45 × 45 cm. Die Art ist schnell und sehr aktiv und nutzt den ganzen Platz, den sie bekommt, also ist größer besser.

TEMPERATUR

Trachylepis quinquetaeniata ist ein Sonnenliebhaber. Tagsüber soll das Terrarium 24-29 °C haben und der Sonnenplatz selbst 32-35 °C, an der Oberfläche gemessen mit einem digitalen Fühler oder einem Infrarotthermometer.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER

Die Art braucht eine mäßige Luftfeuchtigkeit von 60-80 %, tagsüber niedriger und nachts höher.

LICHT UND UVB

Die Art ist tagaktiv und braucht starkes, klares Licht und UVB. Sie sonnt sich in offenem, steinigem Gelände und gehört nach ihrer Lebensweise zur Ferguson-Zone 3.

FÜTTERUNG

Die Art ist Insektenfresser. Gib Grillen, Schaben (z. B.

VERHALTEN UND UMGANG

Trachylepis quinquetaeniata ist schnell, nervös und wachsam und ein Tier zum Beobachten. Sie flieht, verliert den Schwanz und wird von wiederholtem Handling gestresst.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET

Benin, Burkina Faso, Kamerun, Zentralafrikanische Republik, Tschad, Kongo-Kinshasa, Côte d'Ivoire, Dschibuti, Ägypten, Eritrea, Äthiopien, Ghana, Guinea, Kenia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Somalia, Südsudan, Sudan, Tansania, Togo und Uganda.