herpy

SKINKE

Blanchard's Helmet Skink

Tribolonotus blanchardi

Tribolonotus blanchardi ist ein sehr kleiner Skink aus den Wäldern der Salomonen und Bougainvilles. Er misst nur 3-4 cm von der Schnauze bis zur Kloake, lebt verborgen im feuchten Laub entlang kleiner Waldbäche und legt jeweils ein Ei. Über die Art und ihre Haltung ist nur wenig bekannt.

Familie: Scincidae

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**3-4 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**10 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber und in der Dämmerung**
Lebensweise	**Bodenbewohnend und grabend**
Lebensraum	**Regenwald und Bergwald**
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**45 × 30 × 30 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**24-26 °C**
Temperatur, Nacht	**20-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**80-90 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Insekten und kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**1 Eier**
Inkubation	**65-85 Tage** bei 23-27 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Haltung von *Tribolonotus blanchardi* ist nur wenig bekannt.
TEMPERATUR	*Tribolonotus blanchardi* nutzt keine Sonnenplätze. Halte tagsüber 24-26 °C ohne Sonnenplatz und nachts 20-22 °C. Die Nacht darf gern etwas kühler sein als bei *Tribolonotus gracilis*, weil die Art auch im Bergwald lebt.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	*Tribolonotus blanchardi* verträgt Austrocknung sehr schlecht. Die Luftfeuchtigkeit muss hoch sein, 80-90 %, und der Bodengrund muss immer feucht sein. Besprühe morgens und abends oder verwende eine automatische Beregnungsanlage.
LICHT UND UVB	*Tribolonotus blanchardi* lebt verborgen im Laub im schattigen Wald.
FÜTTERUNG	*Tribolonotus blanchardi* frisst Insekten. Gib kleine Beutetiere: kleine Grillen, Taufliegen, Springschwänze, kleine Schaben und kleine Regenwürmer.
VERHALTEN UND UMGANG	*Tribolonotus blanchardi* ist scheu und verbringt die meiste Zeit verborgen. Sie ist ein Tier zum Beobachten und nicht zum Handling. Gib einem neuen Tier mindestens zwei Wochen Ruhe.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Salomonen und Papua-Neuguinea.