herpy

SKINKE

## False Poncelet's Helmet Skink

# *Tribolonotus pseudoponceleti*

*Tribolonotus pseudoponceleti* ist ein kleiner, heimlich lebender Skink von Bougainville und Buka im Norden der Salomonen. Er hat gekielte, raue Schuppen und einen dreieckigen Kopf und lebt unter morschen Baumstämmen, meist paarweise. Die Haltung ist kaum beschrieben und beruht daher auf der Lebensweise der Art in der Natur und auf den nahen Verwandten *Tribolonotus gracilis* und *Tribolonotus novaeguineae*.

Familie: Scincidae

**STECKBRIEF**

### DAS TIER

| | |
|---|---|
| Größe (adult) | **4-7 cm**<br>Kopf-Rumpf-Länge |
| Lebenserwartung | **10 Jahre** |
| Aktiv | **In der Dämmerung und nachts** |
| Lebensweise | **Bodenbewohnend** |
| Lebensraum | **Regenwald** |
| Schwierigkeitsgrad | **Erfahren** |

### HALTUNG

| | |
|---|---|
| Mindestgröße Terrarium | **60 × 40 × 30 cm**<br>L × B × H für 2 erwachsene Tiere |
| Temperatur, Tag | **24-27 °C** |
| Sonnenplatz | **27-28 °C** |
| Temperatur, Nacht | **22-24 °C** |
| Luftfeuchtigkeit | **70-90 %** |
| Wasser | **Wasserschale** |
| UVB | **Empfohlen**<br>Ferguson-Zone 1 |
| Ernährung | **Insekten und Würmer/Schnecken** |
| Haltung | **Einzeln oder paarweise** |

### ZUCHT

| | |
|---|---|
| Fortpflanzung | **Eierlegend** |
| Gelegegröße | **1 Eier** |
| Inkubation | **65-85 Tage**<br>bei 23-27 °C |

### SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

| | |
|---|---|
| CITES | **Nicht gelistet** |
| EU-Anhang | **Nicht gelistet** |
| IUCN | **Nicht gefährdet (LC)** |

## Haltung auf einen Blick

| | |
|---|---|
| **DAS TERRARIUM** | Die Haltung von *Tribolonotus pseudoponceleti* ist kaum beschrieben. Die Art lebt in einem warmen, feuchten Klima und versteckt sich unter morschen Baumstämmen. |
| **TEMPERATUR** | Tagsüber sollen es 24-27 °C am kühlen Ende und 27-28 °C in einem warmen Versteck sein, nachts 22-24 °C. Die Art zeigt sich nicht im Offenen und sonnt sich nicht, wärmt sich aber unter Stämmen und Rinde. |
| **LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER** | Die Luftfeuchtigkeit soll tagsüber bei 70-80 % und nachts bei 80-90 % liegen, und der Boden muss immer feucht, aber nicht triefend nass sein; die Art bevorzugt feuchte, aber nicht wassergesättigte Stellen. |
| **LICHT UND UVB** | Der UVB-Bedarf ist nicht dokumentiert. Die nahen Verwandten kommen ohne UVB aus, wenn das Futter mit Kalzium und Vitamin D3 versetzt wird, aber ein schwaches UVB-Licht wird empfohlen. |
| **FÜTTERUNG** | Die Art frisst kleine Gliederfüßer, in Menschenhand auch Termiten. Das Grundfutter können kleine Grillen, Schaben, Mehlwürmer, Seidenraupen, Larven der Soldatenfliege, Regenwürmer und kleine Schnecken sein. Abwechslung ist wichtig. |
| **VERHALTEN UND UMGANG** | *Tribolonotus pseudoponceleti* ist ein Tier zum Beobachten und nicht zum Anfassen. Wird sie freigelegt, drückt sie sich flach an den Boden und bleibt liegen oder kriecht langsam davon; sie versucht selten zu fliehen. |
| **NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET** | Papua-Neuguinea. |