herpy

SKINKE

Wickelschwanzskink

Corucia zebrata

Der größte Skink der Welt: ein ruhiger, baumbewohnender Pflanzenfresser von den Salomonen mit einem Greifschwanz, der wie ein fünftes Bein wirkt. *Corucia zebrata* lebt in Familiengruppen, bringt große, lebende Junge zur Welt und verlangt ein hohes, feuchtes und gut belüftetes Terrarium sowie reichlich frische Blätter. Eine Art für den erfahrenen Halter mit Geduld.

Familie: Scincidae Englisch: Monkey Skink Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**60-80 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Gewicht	**500-850 g**
Lebenserwartung	**15-25 Jahre**
Aktiv	**In der Dämmerung und nachts**
Lebensweise	**Baumbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald**
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**120 × 60 × 120 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**24-28 °C**
Sonnenplatz	**29-31 °C**
Temperatur, Nacht	**21-24 °C**
Luftfeuchtigkeit	**70-80 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 2
Ernährung	**Obst und Pflanzen**
Haltung	**Einzeln, paarweise oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Lebendgebärend**
Wurfgröße	**1-2 Jungtiere**
Tragzeit	**180-240 Tage**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Potenziell gefährdet (NT)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM
Die Art lebt ihr ganzes Leben auf Bäumen und braucht ein hohes Terrarium. Ein erwachsener Skink braucht mindestens 120 × 60 × 120 cm (Länge × Breite × Höhe), und die Höhe ist wichtiger als die Grundfläche.

TEMPERATUR
Die Art braucht mäßige Wärme. Tagsüber soll die Temperatur 24-28 °C betragen, und ein warmer Platz hoch oben im Terrarium darf 29-31 °C erreichen.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER
Die Luftfeuchtigkeit soll 70-80 % betragen. Sie wird durch Besprühen 2-3 Mal täglich oder eine automatische Sprühanlage, einen feuchten Bodengrund und lebende Pflanzen gehalten.

LICHT UND UVB
Die Art ist in der Dämmerung am aktivsten und kann ohne UVB gehalten werden, wenn D3 über das Futter gegeben wird, aber schwaches UVB-Licht wird empfohlen.

FÜTTERUNG
Corucia zebrata ist Pflanzenfresser und frisst in der Natur Blätter, Blüten, Früchte und Triebe mehrerer Pflanzen, u. a. *Epipremnum*, die das Tier trotz der vielen Oxalatkristalle verträgt.

VERHALTEN UND UMGANG
Die Art ist ruhig und bedächtig in ihren Bewegungen und flieht selten. Fühlt sie sich bedroht, öffnet sie das Maul und faucht, und ein erwachsener Skink kann schmerzhaft durch die Haut beißen.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET
Salomonen und Papua-Neuguinea.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/skinker/corucia-zebrata