herpy

SKINKE

Smaragdskink

Lamprolepis smaragdina

Lamprolepis smaragdina ist ein schlanker, tagaktiver Skink, der auf den Bäumen der Inseln Südostasiens und des westlichen Pazifiks lebt. Er ist in der Regel smaragdgrün mit braunen, weiß gepunkteten Hinterbeinen und verbringt die meiste Zeit auf Stämmen und Ästen. Im Terrarium braucht er Höhe, Wärme, kräftiges UVB und hohe Luftfeuchtigkeit, und er eignet sich am besten als Schautier.

Familie: Scincidae Englisch: Emerald Skink Früherer Name: *Dasia smaragdina; Lygosoma smaragdinum* Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**20-25 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**7-12 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**60 × 45 × 90 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**24-29 °C**
Sonnenplatz	**33-36 °C**
Temperatur, Nacht	**20-25 °C**
Luftfeuchtigkeit	**70-100 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Notwendig** Ferguson-Zone 2
Ernährung	**Insekten, Obst und Fertigfutter**
Haltung	**Einzeln oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**9-13 Monate**
Gelegegröße	**1-2 Eier**
Inkubation	**69-100 Tage** bei 26-29 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM

Ein einzelnes erwachsenes *Lamprolepis smaragdina* braucht ein Terrarium von mindestens 60 × 45 × 90 cm (Länge × Breite × Höhe), und größer ist besser, vor allem in der Höhe.

TEMPERATUR

Der Sonnenplatz für *Lamprolepis smaragdina* soll etwa 35 °C haben, am Ast selbst mit einem digitalen Fühler gemessen. Die kühle Seite soll 24-29 °C haben, und nachts soll die Temperatur 20-25 °C betragen.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER

Die Luftfeuchtigkeit im Terrarium für *Lamprolepis smaragdina* soll tagsüber etwa 70 % betragen und nachts auf bis zu 100 % steigen.

LICHT UND UVB

Lamprolepis smaragdina ist tagaktiv und lebt auf sonnenbeschienenen Bäumen, daher braucht die Art kräftiges UVB und starkes Licht.

FÜTTERUNG

Lamprolepis smaragdina ist in erster Linie Insektenfresser, nimmt aber etwas Obst und Blüten. Das Grundfutter können Grillen, Schaben (zum Beispiel *Blaptica dubia*), Heuschrecken und andere abwechslungsreiche Insekten sein.

VERHALTEN UND UMGANG

Lamprolepis smaragdina ist schnell und scheu und besser als Schautier geeignet denn als Tier zum Anfassen. Ein neues Tier braucht mindestens zwei Wochen Ruhe.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET

Philippinen, Indonesien, Papua-Neuguinea, Salomonen, Mikronesien, Marshallinseln, Palau und Timor-Leste.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/skinker/lamprolepis-smaragdina