herpy

SKINKE

Blauzungenskink

Tiliqua scincoides

Ein kräftiger, schwer gebauter Skink aus Australien und dem östlichen Indonesien mit einer breiten, knallblauen Zunge, die er zeigt, wenn er sich bedroht fühlt. *Tiliqua scincoides* ist tagaktiv, Allesfresser und ruhig, wird 45-60 cm lang und kann etwa 20 Jahre alt werden. Er braucht ein großes Terrarium, UVB und einen warmen Sonnenplatz.

Familie: Scincidae Englisch: Common Blue-tongued Skink Früherer Name: *Lacerta scincoides* Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**45-60 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Gewicht	**400-600 g**
Lebenserwartung	**15-20 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Bodenbewohnend**
Lebensraum	**Savanne und gemäßigter Wald und Wiese**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**180 × 60 × 60 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**21-33 °C**
Sonnenplatz	**35-45 °C**
Temperatur, Nacht	**18-24 °C**
Luftfeuchtigkeit	**40-60 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 3
Ernährung	**Insekten, Obst, Pflanzen und Würmer/Schnecken**
Haltung	**Einzeln**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Lebendgebärend**
Geschlechtsreif	**18-36 Monate**
Wurfgröße	**6-15 Jungtiere**
Gelege pro Jahr	**1**
Tragzeit	**90-120 Tage**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang III**
EU-Anhang	**Anhang C**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM
Ein adultes Tier braucht ein Terrarium von mindestens 180 × 60 × 60 cm (Länge × Breite × Höhe), das entspricht gut 1 m² Bodenfläche. Größer ist besser, und strengere Standards verlangen etwa 180 × 120 × 90 cm.

TEMPERATUR
Das Tier muss zwischen 21-26 °C am kühlen Ende und 28-33 °C am warmen Ende wählen können. Die Oberfläche am Sonnenplatz muss 35-45 °C haben.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER
Die australischen Unterarten brauchen eine Luftfeuchtigkeit von 40-60 %, gemessen am kühlen Ende. Die indonesische *T. s. chimaerea* braucht 60-80 %.

LICHT UND UVB
Die Art ist tagaktiv und braucht sowohl UVB als auch kräftiges Licht. Verwende eine T5-Röhre mit UVB und platziere sie so, dass der UV-Index am Sonnenplatz bei etwa 3-4 liegt (Ferguson-Zone 3).

FÜTTERUNG
Tiliqua scincoides ist ein Allesfresser. Das Grundfutter ist eine Mischung aus Grünem, tierischem Eiweiß und etwas Obst. Jungtiere unter 12 Monaten brauchen 70-80 % Eiweiß, adulte Tiere etwa 50-60 %.

VERHALTEN UND UMGANG
Tiliqua scincoides ist ruhig, und Nachzuchttiere werden oft sehr zahm. Wildfänge sind leichter gestresst und defensiver. Einen Skink zähmt man, indem man ruhig mit ihm spricht und ihn in seinem eigenen Tempo zu sich kommen lässt.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET
Australien und Indonesien.