herpy

SKINKE

# *Tribolonotus blanchardi*

*Tribolonotus blanchardi* ist ein sehr kleiner Skink aus den Wäldern der Salomonen und Bougainvilles. Er misst nur 3-4 cm von der Schnauze bis zur Kloake, lebt verborgen im feuchten Laub entlang kleiner Waldbäche und legt jeweils ein Ei. Über die Art und ihre Haltung ist nur wenig bekannt.

Familie: Scincidae  Englisch: Blanchard's Helmet Skink  Veröffentlicht am 16. November 2026

## STECKBRIEF

### DAS TIER

| | |
|---|---|
| Größe (adult) | **3-4 cm**<br>Kopf-Rumpf-Länge |
| Lebenserwartung | **10 Jahre** |
| Aktiv | **Tagsüber und in der Dämmerung** |
| Lebensweise | **Bodenbewohnend und grabend** |
| Lebensraum | **Regenwald und Bergwald** |
| Schwierigkeitsgrad | **Erfahren** |

### HALTUNG

| | |
|---|---|
| Mindestgröße Terrarium | **45 × 30 × 30 cm**<br>L × B × H für 1 erwachsenes Tier |
| Temperatur, Tag | **24-26 °C** |
| Temperatur, Nacht | **20-22 °C** |
| Luftfeuchtigkeit | **80-90 %** |
| Wasser | **Wasserschale** |
| UVB | **Empfohlen**<br>Ferguson-Zone 1 |
| Ernährung | **Insekten und kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)** |
| Haltung | **Einzeln oder paarweise** |

### ZUCHT

| | |
|---|---|
| Fortpflanzung | **Eierlegend** |
| Gelegegröße | **1 Eier** |
| Inkubation | **65-85 Tage**<br>bei 23-27 °C |

### SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

| | |
|---|---|
| CITES | **Nicht gelistet** |
| EU-Anhang | **Nicht gelistet** |
| IUCN | **Nicht gefährdet (LC)** |

## Haltung auf einen Blick

| | |
|---|---|
| **DAS TERRARIUM** | Über die Haltung von *Tribolonotus blanchardi* ist nur wenig bekannt. |
| **TEMPERATUR** | *Tribolonotus blanchardi* nutzt keine Sonnenplätze. Halte tagsüber 24-26 °C ohne Sonnenplatz und nachts 20-22 °C. Die Nacht darf gern etwas kühler sein als bei *Tribolonotus gracilis*, weil die Art auch im Bergwald lebt. |
| **LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER** | *Tribolonotus blanchardi* verträgt Austrocknung sehr schlecht. Die Luftfeuchtigkeit muss hoch sein, 80-90 %, und der Bodengrund muss immer feucht sein. Besprühe morgens und abends oder verwende eine automatische Beregnungsanlage. |
| **LICHT UND UVB** | *Tribolonotus blanchardi* lebt verborgen im Laub im schattigen Wald. |
| **FÜTTERUNG** | *Tribolonotus blanchardi* frisst Insekten. Gib kleine Beutetiere: kleine Grillen, Taufliegen, Springschwänze, kleine Schaben und kleine Regenwürmer. |
| **VERHALTEN UND UMGANG** | *Tribolonotus blanchardi* ist scheu und verbringt die meiste Zeit verborgen. Sie ist ein Tier zum Beobachten und nicht zum Handling. Gib einem neuen Tier mindestens zwei Wochen Ruhe. |
| **NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET** | Salomonen und Papua-Neuguinea. |

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/skinker/tribolonotus-blanchardi