herpy

SKINKE

Tribolonotus schmidti

Tribolonotus schmidti ist ein kleiner, scheuer Skink von Guadalcanal auf den Salomonen mit zwei Reihen plattenförmiger Schuppen auf dem Rücken. Er lebt verborgen in der feuchten Laubschicht des Waldbodens und bringt lebende Junge zur Welt, eines nach dem anderen, im Gegensatz zu den beiden besser bekannten Verwandten, die Eier legen.

Familie: Scincidae Englisch: Schmidt's Crocodile Skink Früherer Name: *Pediporus schmidti* Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**9-10 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**8-10 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber und in der Dämmerung**
Lebensweise	**Bodenbewohnend und grabend**
Lebensraum	**Regenwald und Bergwald**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**60 × 45 × 45 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**24-27 °C**
Sonnenplatz	**27-28 °C**
Temperatur, Nacht	**22-24 °C**
Luftfeuchtigkeit	**70-90 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Insekten und Würmer/Schnecken**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Lebendgebärend**
Wurfgröße	**1 Jungtiere**
Tragzeit	**65-85 Tage**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Haltung von *Tribolonotus schmidti* ist nur wenig bekannt.
TEMPERATUR	Halte das Terrarium für *Tribolonotus schmidti* tagsüber bei 24-27 °C, mit einem warmen Versteck bei 27-28 °C, und lass die Temperatur nachts auf 22-24 °C fallen.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Für *Tribolonotus schmidti* muss die Luftfeuchtigkeit 70-90 % betragen, und der Bodengrund muss immer feucht sein.
LICHT UND UVB	*Tribolonotus schmidti* schläft nachts und ist vermutlich tagsüber und in der Dämmerung in der schattigen Laubschicht aktiv.
FÜTTERUNG	*Tribolonotus schmidti* ist Insektenfresser. Das Grundfutter können Grillen, Schaben, Mehlwürmer, kleine Larven und Regenwürmer sein. Schnecken und Würmer können zur Abwechslung angeboten werden.
VERHALTEN UND UMGANG	*Tribolonotus schmidti* ist ein scheuer Skink, der verborgen lebt und ein Tier zum Beobachten und nicht zum Handling ist. Die Gattung kann Laute von sich geben, aber das ist für die Art nicht dokumentiert.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Salomonen.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/skinker/tribolonotus-schmidti