herpy

SCHLANGEN

Corallus batesii

Corallus batesii ist eine schlanke, baumbewohnende Boa aus dem Amazonasbecken. Erwachsene Tiere sind dunkelgrün mit weißer Zeichnung und gelbem Bauch, die Jungtiere rotorange. Die Weibchen erreichen etwa 195 cm, die größten Tiere nähern sich 270 cm. Die Art wurde 2009 von *Corallus caninus* abgetrennt, der heute nur noch die Populationen auf dem Guayana-Schild umfasst. Sie verlangt ein großes, hohes und feuchtes Terrarium und einen erfahrenen Halter.

Familie: Boidae Englisch: Amazon Basin Emerald Tree Boa Früherer Name: *Chrysenis batesii* Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**120-270 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**15-20 Jahre**
Aktiv	**Nachts**
Lebensweise	**Baumbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald**
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**180 × 60 × 120 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**24-29 °C**
Sonnenplatz	**30-33 °C**
Temperatur, Nacht	**22-26 °C**
Luftfeuchtigkeit	**65-80 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 2
Ernährung	**Wirbeltiere**
Haltung	**Einzeln**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Lebendgebärend**
Geschlechtsreif	**36-60 Monate**
Wurfgröße	**5-25 Jungtiere**
Tragzeit	**180-210 Tage**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM

Ein erwachsenes Tier braucht ein Terrarium von mindestens 180 × 60 × 120 cm (Länge × Breite × Höhe), und größer und vor allem höher ist besser, da *Corallus batesii* größer wird als *C. caninus*.

TEMPERATUR

Corallus batesii braucht gleichmäßige Wärme im ganzen Terrarium und einen deutlichen Sonnenplatz. Der Sonnenplatz, ein waagerechter Ast unter der Wärmequelle, soll 30-33 °C haben.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER

Die Luftfeuchtigkeit muss hoch und stabil sein, und 65-80 % sind ein guter Ausgangspunkt. Die Angaben reichen von 65-75 % für *Corallus batesii* bis 75-90 % für *C. caninus*.

LICHT UND UVB

Die Art ist nachtaktiv und kommt ohne UVB zurecht, aber schwaches UVB-Licht sorgt für einen deutlicheren Tagesrhythmus und sichert Vitamin D3. Die Art gehört zur Ferguson-Zone 2, mit einem UV-Index von etwa 2-3 am Sonnenplatz.

FÜTTERUNG

Corallus batesii braucht ganze Beutetiere. Ratten sind das beste Futter, von Rattenwelpen mit 4-6 g für Jungtiere bis zu mittelgroßen Ratten von etwa 175 g für erwachsene Tiere.

VERHALTEN UND UMGANG

Corallus batesii ist tagsüber meist ruhig und friedlicher als *C. caninus*, aber kein Tier für häufiges Handling, und junge Tiere sind oft nervös und abwehrbereit.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET

Brasilien, Peru, Bolivien, Ecuador und Kolumbien.