herpy

SCHLANGEN

Kenia-Sandboa

Eryx colubrinus

Eryx colubrinus ist eine kleine, kräftig gebaute Boa aus den Trockengebieten Ostafrikas, die die meiste Zeit im Sand vergraben verbringt und nur die nach oben gerichteten Augen über die Oberfläche streckt. Sie ist ruhig, braucht nicht viel Platz und kann 20-30 Jahre alt werden, daher ist sie eine gute Wahl für alle, die ihre erste Schlange halten möchten.

Familie: Boidae Englisch: Kenyan Sand Boa Früherer Name: *Gongylophis colubrinus; Eryx thebaicus* Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**40-65 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**20-30 Jahre**
Aktiv	**In der Dämmerung und nachts**
Lebensweise	**Bodenbewohnend und grabend**
Lebensraum	**Wüste und Halbwüste**
Schwierigkeitsgrad	**Einsteiger**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**60 × 30 × 30 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**26-28 °C**
Sonnenplatz	**33-35 °C**
Temperatur, Nacht	**22-25 °C**
Luftfeuchtigkeit	**20-40 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 2
Ernährung	**Wirbeltiere**
Haltung	**Einzeln**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Lebendgebärend**
Wurfgröße	**10-20 Jungtiere**
Gelege pro Jahr	**1**
Tragzeit	**120-180 Tage**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM

Eine erwachsene *Eryx colubrinus* braucht ein Terrarium von mindestens 60 × 30 × 30 cm (Länge × Breite × Höhe), gern 90 × 45 × 45 cm. Weibchen, die größer als der Durchschnitt sind, brauchen mehr als das Minimum.

TEMPERATUR

Eryx colubrinus verträgt trockene, warme Bedingungen. Es muss ein warmes und ein kühles Ende geben. Die Oberfläche unter dem Wärmestrahler soll 33-35 °C haben, das kühle Ende 26-28 °C.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER

Eryx colubrinus lebt in einem trockenen Klima, und das Terrarium soll die meiste Zeit trocken sein. Die Luftfeuchtigkeit liegt am besten bei etwa 20-40 %; die Zahl ist eine Schätzung nach dem Lebensraum.

LICHT UND UVB

Eryx colubrinus ist vor allem in der Dämmerung und nachts aktiv und kann ohne UVB leben, doch eine schwache UVB-Röhre wird empfohlen, weil sie den Tagesrhythmus unterstützt und den Vitamin-D3-Bedarf deckt.

FÜTTERUNG

Eryx colubrinus ist Fleischfresser und nimmt ganze Beutetiere. Das Grundfutter sind Mäuse: Erwachsene Weibchen können eine große ausgewachsene Maus nehmen, erwachsene Männchen eine große Hoppermaus.

VERHALTEN UND UMGANG

Eryx colubrinus ist ruhig und beißt selten. Lass neue Tiere zwei Wochen eingewöhnen und beginne erst mit der Handhabung, wenn sie regelmäßig fressen.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET

Ägypten, Sudan, Südsudan, Äthiopien, Eritrea, Kenia, Tansania und Somalia.