herpy

SCHLANGEN

Gemeine Strumpfbandnatter

Thamnophis sirtalis

Thamnophis sirtalis ist eine schlanke, tagaktive und neugierige Schlange mit hellen Streifen entlang des Körpers. Sie lebt am Wasser vom Süden Kanadas durch den größten Teil der USA bis in den Norden Mexikos. Sie ist robust, bleibt tagsüber wach und sichtbar und kann von aufgetauten Mäusen leben, ist aber ein Meister im Ausbrechen und braucht ein völlig dichtes Terrarium.

Familie: Colubridae Englisch: Common Garter Snake Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**50-100 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**6-10 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Bodenbewohnend und semiaquatisch**
Lebensraum	**Feuchtgebiet und gemäßigter Wald und Wiese**
Schwierigkeitsgrad	**Einsteiger**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**100 × 50 × 50 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**23-27 °C**
Sonnenplatz	**29-32 °C**
Temperatur, Nacht	**18-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**35-60 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 2
Winterruhe	**8-15 °C** 8-16 Wochen
Ernährung	**Wirbeltiere und Würmer/Schnecken**
Haltung	**Einzeln oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Lebendgebärend**
Geschlechtsreif	**18-24 Monate**
Wurfgröße	**10-40 Jungtiere**
Gelege pro Jahr	**1**
Tragzeit	**60-90 Tage**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein adultes Tier von *Thamnophis sirtalis* braucht ein Terrarium von mindestens 100 × 50 × 50 cm (Länge × Breite × Höhe), und ein Weibchen über 80 cm braucht 120 × 60 × 60 cm.
TEMPERATUR	Es muss ein deutliches Wärmegefälle geben. Der Sonnenplatz muss an der Oberfläche 29-32 °C haben, das kühle Ende 23-27 °C und die Nacht 18-22 °C. Die Wärmequelle wird nachts abgeschaltet.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Luftfeuchtigkeit sollte bei 35-60 % liegen, am höchsten am kühlen Ende und nachts. Das Terrarium soll nicht nass sein, denn anhaltende Feuchtigkeit führt zu Blasen am Bauch.
LICHT UND UVB	Die Art ist tagaktiv und gedeiht bei kräftigem Tageslicht. UVB ist nicht unbedingt nötig, wird aber empfohlen und macht die Schlange oft aktiver.
FÜTTERUNG	*Thamnophis sirtalis* nimmt andere Beutetiere als die meisten Schlangen: Regenwürmer, Fische und Nager. Insekten wie Heimchen und Mehlwürmer frisst sie nicht.
VERHALTEN UND UMGANG	*Thamnophis sirtalis* ist schnell und neugierig und wird meist zahm, wenn sie von klein auf regelmäßig angefasst wird. Lass neue Tiere etwa zwei Wochen eingewöhnen, und beginne erst mit dem Handling, wenn sie fest fressen.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Kanada, Mexiko und Vereinigte Staaten.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/slanger/thamnophis-sirtalis