herpy

WARANE

Schwarzer Baumwaran

Varanus beccarii

Ein kleiner, schwarzer, baumbewohnender Waran von den Aru-Inseln vor Neuguinea mit Greifschwanz und ungewöhnlich langen Vorderbeinen, die er bei der Jagd wie Hände benutzt. Das Tier ist nervös, braucht ein hohes, warmes Terrarium mit hoher Luftfeuchtigkeit und ist schwer zur Fortpflanzung zu bringen, daher eignet es sich nur für einen erfahrenen Halter.

Familie: Varanidae Englisch: Black Tree Monitor Früherer Name: *Varanus prasinus beccarii; Monitor beccarii* Veröffentlicht am 15. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**80-120 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Gewicht	**220-300 g**
Lebenserwartung	**10-17 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald und Feuchtgebiet**
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**150 × 100 × 150 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**26-30 °C**
Sonnenplatz	**35-40 °C**
Temperatur, Nacht	**22-24 °C**
Luftfeuchtigkeit	**55-70 %**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 2
Ernährung	**Insekten und Wirbeltiere**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**3 Eier**
Inkubation	**157-203 Tage** bei 29-30 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Ungenügende Datengrundlage (DD)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein erwachsenes Tier braucht ein hohes Terrarium von mindestens 150 × 100 × 150 cm (Länge × Breite × Höhe), und größer ist besser.
TEMPERATUR	Die Tagestemperatur im Terrarium soll bei etwa 26-30 °C liegen, darf aber im Terrarium gern zwischen 24 und 35 °C schwanken. Unter einer Wärmelampe soll es einen Sonnenplatz mit 35-40 °C geben.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Luftfeuchtigkeit in Gefangenschaft liegt meist bei 55-70 % mit Schwankungen im Tagesverlauf.
LICHT UND UVB	*Varanus beccarii* ist tagaktiv und sollte UVB-Licht bekommen. Dokumentierte Aufbauten verwenden eine kombinierte Wärme- und UVB-Lampe von 100-160 W über dem Sonnenplatz, in einigen Fällen ergänzt durch gefiltertes Tageslicht.
FÜTTERUNG	Die Art frisst hauptsächlich lebende Insekten. Dokumentiertes Futter für Erwachsene sind Schaben (z. B. *Blaptica dubia*), ergänzt durch Mehlwürmer, Zophobas (*Zophobas morio*), Heimchen und Larven von Rosenkäfern (*Pachnoda*).
VERHALTEN UND UMGANG	*Varanus beccarii* ist nervös und wird durch Handling leicht gestresst.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Indonesien.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/varaner/varanus-beccarii