herpy

WARANE

Varanus boehmei

Ein schlanker, schwarzer Baumwaran mit goldenen Flecken in V-förmigen Reihen, der nur auf der Insel Waigeo vor Neuguinea vorkommt. Die Art ist in Gefangenschaft selten und schlecht bekannt, daher beruht die Pflege hier auf Zahlen nah verwandter Arten. Sie braucht ein großes, hohes und feuchtes Terrarium, tägliches Besprühen und einen Halter mit Erfahrung.

Familie: Varanidae Englisch: Golden speckled tree monitor Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**70-90 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**8-12 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald**
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**150 × 100 × 150 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**26-30 °C**
Sonnenplatz	**38-45 °C**
Temperatur, Nacht	**22-25 °C**
Luftfeuchtigkeit	**60-90 %**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 2
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**3 Eier**
Inkubation	**157-161 Tage** bei 29-30 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Ungenügende Datengrundlage (DD)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	*Varanus boehmei* ist ein Kletterer, daher ist die Höhe wichtiger als die Grundfläche.
TEMPERATUR	Die Zahlen für *Varanus boehmei* sind von *V. beccarii* und anderen Arten der Gruppe übernommen. Tagsüber soll die Lufttemperatur 24-34 °C betragen.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Arten der *V. prasinus*-Gruppe trocknen leicht aus und sind schwieriger zu halten als viele andere Warane.
LICHT UND UVB	*Varanus boehmei* ist vermutlich tagaktiv und sonnt sich hoch in den Bäumen, daher ist Licht sowohl Wärme als auch UVB.
FÜTTERUNG	Verwandte in der Gruppe ernähren sich überwiegend von Insekten und anderen Wirbellosen, und das gilt vermutlich auch für *Varanus boehmei*. Über 90 % des Futters (nach Gewicht) sollen Insekten wie Schaben und Larven von *Pachnoda* und *Zophobas* sein, und gelegentlich können Fisch, Eier (auch mit Schale) oder ein Eintagsküken gegeben werden.
VERHALTEN UND UMGANG	*Varanus boehmei* ist klein und leicht gebaut, und ein erwachsenes Tier von 70-90 cm hat scharfe Krallen und kann beißen, aber die Verletzungen sind nicht mit denen großer Warane vergleichbar.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Indonesien.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/varaner/varanus-boehmei